

355728

Справ. № 72.

Профессор
К. А. ШМЕЛЕВ

~~61.
Ш-722.~~

РЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ВРАЧА

Издание 2-е, исправленное
и дополненное

ОГИЗ


1942

САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Профессор
К. А. Шмелев

РЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ВРАЧА

Издание 2-е, исправленное
и дополненное



ОГИЗ 1942
САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

РЕЦЕПТ, НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ПРОПИСЫВАНИЯ ЕГО

Поскольку рецепт является официальным документом, содержащим в себе письменное предложение врача о приготовлении лекарства со всеми относящимися к этому указаниями, при его выписывании необходимо строго соблюдать определенные правила.

1) Рецепт должен быть написан достаточно разборчиво во избежание возможных недоразумений, как правило, чернилами.

2) При необходимости выписать на одном листке бумаги несколько прописей, последние должны отделяться друг от друга определенным знаком. Чаще всего эту функцию выполняет знак № средневековый символ слов „Сим Deo“, ставившихся в начале рецепта.

3) В случае необходимости продолжить рецепт на другой стороне листка, внизу первой необходимо написать соответствующее указание—„verte“, т. е. „переверни“.

4) При назначении сильнодействующих средств нельзя в предписании больному ограничиваться общими указаниями о способах приема („как сказано“ и т. п.), необходимо в этих случаях особенно ясно сформулировать точное предписание.

5) При необходимости назначить дозу сильнодействующего или ядовитого средства, большую максимально дозволенной фармакопеей, врач должен ука-

зать фармацевту, что это сделано им сознательно, а не по ошибке; последнее достигается постановкой восклицательного знака после цифры, обозначающей дозу, и написанием в скобках величины дозы прописью.

6) Повторное назначение уже раз выписанной больному прописи осуществляется тем, что пишут на сигнатре: дату (год, месяц и число), слово „Repetatur“ или „Reiteretur“, что значит „повторить“, и подпись врача.

7) Если пропись должна быть приготовлена немедленно, то на рецепте делается соответствующая надпись: „Cito!“—быстро, „Citissime!“—как можно быстрее, „Statim!“—тотчас, сейчас же. Не следует предъявлять подобные требования без действительной в том необходимости, так как в этом случае фармацевт должен оставить всю остальную работу и заняться немедленно изготовлением такой прописи.

8) Не следует, особенно начинающему, выписывать слишком сложных прописей, с большим числом различных ингредиентов, так как увеличивается возможность назначения несовместимых комбинаций. В таких случаях целесообразнее дать два отдельных назначения.

9) Сокращение при выписывании как самих названий лекарственных веществ, так и в остальных частях рецепта вполне допустимы, но отнюдь не в ущерб ясности написанного, что, к сожалению, бывает нередко. Нельзя, например, написать в рецепте *Natr. sulfur.*, так как это может быть истолковано фармацевтом и как *Natrium sulfurosum* (сернистокислый натрий), и как *Natrium sulfuratum* (сернистый натрий), и как *Natrium sulfuricum* (сернокислый натрий). Все сокращения необходимо делать на согласных буквах; в случае наличия двух согласных,

отбрасывают часть слова, стоящую после второй согласной: Aq. destill.

¶ Приводим перечень наиболее употребительных в рецептурной практике терминов и их сокращений.

A—a—a поровну.

Ad chart. cer.—ad chartam ceratam—в восковой (парафиновой) бумаге.

Ad lib.—ad libitum—по желанию, сколько угодно.

ad us.—ad usum—для употребления (ext.—externum—наружного; internum—внутреннего; propri.—proprietatum—собственного; veter.—veterinarium—ветеринарного; not.—notum—известного).

aeq.—aequalis—равный.

Alb. ov.—Albumen ovi—яичный белок.

Aq.—Aqua—вода (dest.—destillata—перегнанная; ferv.—fervida—горячая; frig.—frigida—холодная).

Ax.—Axungia—сало.

Bals.—Balsamum—бальзам.

But.—But, rum—масло (твердое).

Caps. amyl.—Capsulae amylaceae—облатки.

Caps. gel.—Capsulae gelatinosae—капсулы желатиновые.

c.—cum—с.

conc.—concisis—изрезанный.

concentr.—concentratus—концентрированный.

consp.—consperge—обсыпь.

comp.—compositus—сложный.

corr.—corrosivus—разъедающий.

cort.—cortex—корка.

D., d.—dosis—прием; da, defur, dentur—дай, отпусти.

d. in duplo—da in duplo—дай вдвое.

d. t. d.—dentur tales doses—отпусти таких приемов

D. S.—Dentur, Signetur—дай и обозначь,

Dec., dec.,—decoctum—отвар.

dep.—depuratus—очищенный.

dil.—dilutus—разбавленный.

div.—in p. aeq.—divide in partes aequales—раздели на равные части.

e, ex—из, от.

Elaeos.—Elaeosaccharum—масло-сахар.

elect.—electuarium—кашка.

em., emuls.—emulsio—эмulsionия.

empl.—emplastrum—пластырь.

extr.—extractum—экстракт.

f.—fiat, fiant—сделать, образовать (ut fiat).

f. l. art.—fiat lege artis—сделать по правилам искусства.

fl.—flores—цветы; fluidus—жидкий.

Fol., fol.—folia—листья.

g.—grammum—грамм.

glob.—globulus—шарик (вагинальный).

gtt.—gutta—капля.

Herb., herb.—herba—трава.

inject.—injectio—вприскивание.

infusio—вливание.

inf.—infusum—настой.

linim.—linimentum—жидкая мазь.

liq.—liquor—жидкость.

M., m.—misce—смешай.

M. D. S.—Misce, Detur, Signetur—смешай, дай, обозначь.

m. f.—misce, fiat—смешай, сделай.

m. f. pulv.—misce, fiat pulvis—смешай, сделай порошок.

mixt.—mixtura—микстура.

mucil.—mucilago—слизь.

N.—numerus—число, numero—числом.

ol.—oleum—масло (жидкое).

p.—pars—часть.

- p. aeq.—partes aequales—равные части.
pill.—pílula,—ае—пилюля,—ли.
pp., pet., praec—praecipitatus—осажденный.
prt., praep.—praeparatus—приготовленный, обработанный.
pr.—pro—для; pro injectio (nibus)—для впрыскивания (ний).
pro balneo—для ванн.
pulv.—pulvis—порошок.
q. l.—quantum libet—сколько угодно.
q. s.—quantum satis, quantum sufficiens—в достаточном количестве.
r., rad.—radix—корень.
rect.—rectificatus—очищенный.
Reit.—reiteretur—повтори.
Rep.—teretatur—повтори; non teretatur—повторять не следует.
Rhiz.—rhízoma—корневище.
S., sat.—satis—довольно; signa, signetur—обозначь.
Sem.—semen—семя.
simpl.—simplex—простой.
sir.—sírupus—сироп.
sinap.—sinapisma—горчичик.
sine—без.
sol.—solutio—раствор; solutus—растворенный.
solv.—solve—раствори.
sp.—species—сбор.
succ.—succus—сок.
supp.—suppositorium—свечка.
tabl., tabl.—tabuletta—таблетка.
Tr., tct., tinct.—tinctura настойка.
troch.—trochisci—лепешки.
ust.—ustus—жженый.
ung.—unguentum—мазь.
us.—usus—употребление.

ut, f.—ut fiat—чтобы было.
vitr.—vitrum—стекло.
verte—переверни.

Подавляющее большинство прописей, с которыми приходит я обычно иметь дело врачу в его практической работе, могут быть сведены к нескольким типам формам рецептов. Формы эти следующие:

А) Простейшим является случай, когда выписывается какое-либо вещество *per se*, не требующее никаких предварительных манипуляций, кроме отвещивания (1), или препарат, имеющийся в аптеке уже в готовом виде (официальный) (2), или же когда указание на необходимую форму и, следовательно, на операции имеется уже в прописи препарата (3).

1) Rp.: Olei nigril 20,0

D. S. На один прием.

Rp.: Natrii bivo iei 50,0

D. S. Чайную ложку на стакан воды.

Полоскание.

2) Rp.: Tinct. jodi 25,0

D. S. Для смазывания.

Rp.: Liq. anodyn s Hoffmanni 20,0

D. S. По 15—20 кап. на прием.

Rp.: Olei camphorae 20% 10,0

D. S. Pro injecionibus.

3) Rp.: Infusi Adonis vernalis ex 6,0—200,0

D. S. По 1 стол. ложке 4—5 раз в день.

Rp.: Solutionis Calcii chlorat ex 10,0—200,0

D. S. Через 3 часа по стол. ложке.

Б) Второй формой прописи является рецепт, в котором имеет место простое смешение двух препаратов:

Rp.: Tinct. convallar. majal.

Tinct. valerian. aether. aa 10,0

M. D. S. По 20 кап. 3 раза в день.

Rp.: Infus. rad Ipecacuanhae ex 0,5—150,0

Morphini muriatici 0,08

Syrupi simplic. 20,0

M. D. S. Через 4 часа по стол. ложке.

В) Часто встречающийся случай назначения лекарственного вещества *per se* или препарата официального с предварительным разделением его на определенные дозы.

Rp.: Aspirini 0,5

D. t. d. № 6

S. По 1 порошку 3 раза в день.

Rp.: Camphor. тоновром. 0,15

D. t. d. № 6 in caps. gelatin.

S. По 1 капс. 3 раза в день.

Rp.: Pilul. Blaudil cum Acidō arsenicosi 0,001

D. t. d. № 60.

S. По 1 пилюле 3 раза в день за едой.

Г) Случай, когда назначенным ингредиентам прописи необходимо придать какую-либо определенную форму, избранную по тем или иным соображениям врачом (порошок, мазь, свеча, пиллюли и пр.) с указанием числа взятых доз или без такового:

Rp.: Aspirini 0,5

Coffeini natr.-salicyl. 0,1

M. f. pulv. D. t. d. № 6.

S. По 1 пор. 3 раза в день.

Rp.: Acidō arsenicosi 0,05

Extr. et pulver. Liquirit. q. s.

ut fiant pilul. № 50

D. S. По 1 пил. 3 раза в день за едой.

Rp.: Extr. Belladonnae 0,015

Butyri Cacao 1,5

M. f. suppos. D. t. d. № 6.

S. По 1 свечке 2 раза в день.

Rp.: Sulfur praecip. 5,0

Ac. salicylici 1,0

Vaselini 50,0

M. f. unguent.

D. S. Мазь при себоррее лица.

Д) Случай, когда врач выписывает общее количество лекарственного вещества, которое необходимо отпустить больному, и указывает количество частей, на которое нужно его разделить;

Rp.: Coffeini puri 0,5

Aspirini 5,0

M. f. pulv. Divide in partes aequales № 10.

D. S. По 1 пор. 2-3 раза в день.

Вычисления при выписывании рецепта представляют иногда для начинающего врача некоторую трудность. Необходимо подчеркнуть, что правильное дозирование лекарственных веществ дело не легкое—для этого необходимо не одно только знание обычно назначаемых разовых и суточных доз и максимальных доз, установленных фармакопеей; правильное дозирование возможно только при наличии хорошего знания фармакодинамики, учета всех индивидуальных особенностей данного больного, способа введения лекарственного вещества в организм и формы, в которой оно назначается.

Что же касается самих вычислений, которые применяются при этом, то они не сложны и производятся всегда по известному шаблону.

Исходными точками этих вычислений являются:

1) избранная врачом разовая доза; 2) число приемов

за сутки; 3) та или иная длительность применения лекарственного средства и 4) возможная длительность хранения назначаемой формы.

Несколько примеров, поясняющих производство этих вычислений.

1. Больному необходимо назначить комбинацию аспирина с кофеином. Разовая доза первого 0,5, разовая доза второго в виде натрио-салциловой соли—0,1; очевидно, что каждый прием будет состоять из указанных доз обоих лекарственных веществ; поскольку врач назначает таких приемов за сутки, скажем, три и считает необходимым принимать эти лекарственные средства в течение трех дней, число разовых доз = $1 \times 3 \times 3 = 9$; круглым числом (удобство приготовления) 10, что и находит свое отражение в рецепте: D. t. d. № 10.

2. Ребенку 7 лет необходимо назначить сантонин; исходя из того, что максимальной разовой дозой этого вещества для взрослого является 0,1, суточной 0,3 (см. таблицу максимальных доз), а для ребенка 7 лет, согласно фармакопее, они составляют $\frac{1}{3}$ этих доз, максимальные дозы для данного случая будут соответственно 0,033 и 0,1; обычно назначаемые дозы равны 0,02–0,025, соотв. 0,05–0,07; число приемов в сутки обычно 2, длительность лечения—не больше 3 дней; для замедления всасывания, т. е. для удержания сантонина на возможно более длительное время в кишечнике, необходимо назначать прием его после еды. Все сказанное приводит к тому, что разовая доза в 0,025 назначается в количестве $1 \times 2 \times 3 = 6$ порошков; так как желательно более быстрое выведение оглушенных паразитов из кишечника, сантонин часто назначают одновременно с какими-либо слабительными, в частности с каломелем, подходящая разовая доза которого

в данном случае = 0,05. Таким образом все назначение принимает вид рецепта:

Rp.: Sanionini 0,025

Calomel. 0,05

Talcı puri 0,2

M. f. pulv. D. t. d. № 6.

S. По 1 пор. утром и вечером после еды.

3. Взрослому необходимо назначить инфуз из горицвета; в качестве мочегонного необходимо добавить натрово-салцилоловый кофеин. Для горицвета высшая разовая доза 0,8, суточная 10,0. Обычная разовая доза = 0,5, суточная 3,0—5,0. Обычное число приемов за день—6. Таким образом необходимо назначить больному $0,5 \times 6 = 3,0$ горицвета на сутки. Так как его назначают обычно в форме настоя (инфуза), который нерационально выписывать в количествах больших, чем нужно на 2 дня, то очевидно, что для приготовления настоя на этот срок необходимо взять 6,0 травы. Настой обычно дозируется столовыми ложками; каждая вмещает 15,0 его; следовательно на сутки потребуется $15,0 \times 6 = 90,0$, а на двое— $90 \times 2 = 180,0$. Очевидно, что наш инфуз должен быть приготовлен из 6,0 травы на 180,0 воды. Разовая доза Coffeini natrio-salicylici в качестве мочегонного обычно 0,1—0,2; принимая во внимание, что инфуза на сутки назначено 90,0, мы должны иметь в этом количестве его необходимую суточную дозу кофеина, т. е. около 1,0; на двое суток это дает 2,0.

Назначение принимает вид:

Rp.: Infusi Herb. Adonis vernalis ex 6,0—180,0
Coffeini natrio-salicylici 2,0
M. D. S. по 1 стол. ложке 6 раз в день.

4. При назначении сложных мазей поступают следующим образом. Сперва решается вопрос о действующих ингредиентах мази и ее основе; названия намеченных препаратов выписывают в обычном порядке (*basis, adjuvans, constituents*), после чего определяют и обозначают желательное количество мазевой основы; в заключение определяют необходимые количества лекарственных веществ.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕЦЕПТУРНЫЕ ФОРМЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

При назначении лекарственных веществ в той или иной форме врач, помимо учета таких особенностей, как физико-химические свойства их (растворимость и пр.), портативность формы, скорость всасывания и т. п., должен еще учитывать ряд и других моментов, главным образом технического порядка.忽りрование этих последних ведет обычно к ряду неудобств для больного, иногда к невозможности приготовить пропись в аптеке и т. п.

Твердые лекарственные формы

Порошки для внутреннего употребления.

В форме неразведенных (неразделенных) порошков можно назначать только такие лекарственные средства, которые не требуют точной дозировки и не содержат, следовательно, сильно действующих веществ. В этих случаях дозирование осуществляется самим больным, обычно с помощью чайной ложки. Количество вещества, содержащегося в обычной чайной ложке, может колебаться в зависимости от удельного веса вещества, в довольно широких пределах; так, для минеральных солей это количество

колеблется в пределах 3,0—6,0; для различных порошков растительного происхождения 2,0—3,0; для ряда веществ оно = 0,3—0,5 (жженая магнезия). Крайней неточностью страдает назначение „на кончике ножа“ и его нужно избегать. Общее количество неразделенного порошка, выписываемое врачом, обычно колеблется в пределах от 25,0 до 100,0.

Разделенные порошки вполне обеспечивают необходимую точность дозировки. Необходимо учитывать, что порошок должен иметь определенный объем, для чего к веществам, назначаемым в небольших дозах (менее 0,25—0,3), прибавляют то или иное индифферентное вещество, причем общий вес порошка не должен превышать 1,0. Наиболее применяемые в качестве индифферентных веществ: *Saccharum album*, *Sacchar. lactis*, *Natr. bicarbonicum*, иногда *Pulv. Liquiritiae*; в случае невозможности воспользоваться этими органическими веществами (каломель, ляпис), употребляют *Talcum purum*.

Если вещество гигроскопично, то лучше употреблять из выше перечисленных препаратов *Saccharum lactis*, так как *Saccharum album* сам обладает некоторой гигроскопичностью, и выписывают его в вощеной бумаге (*in charta cerata*) или в парафинированной (*in charta parafinata*).

При назначении в порошке веществ с неприятным вкусом или запахом можно в качестве исправляющих вкус веществ (*corrugens*) прибавлять маслосахара (*Elaeosacchara*). Наиболее это: *Elaeosacch. Anisi* (анисовый), *Menthae piperitae* (перечной мяты), *Foeniculi* (укропный) и *Citri* (лимонный); можно пользоваться также и *Pulvis Liquiritiae*, обладающим сладким вкусом. При назначении порошка с маслосахаром его приходится выписывать в вощеной, соотв. парафиновой бумаге, так как эфирные масла летучи.

Однако, при наличии неприятного вкуса или запаха вещества можно назначать и без *corrīgens*, но в облатках (крахмальные капсулы) или в желатиновых капсулах (*capsulae gelatinosae*).

Необходимо обратить внимание на то, что многие прописи, назначаемые в порошках, изготавляются в настоящее время в форме таблеток. В последнем издании Союзной фармакопеи около 25 наиболее ходовых прописей сделаны официальными в форме таблеток.

Пилюли удобны в ряде случаев и поэтому до сих пор сохранились как форма для назначения многих лекарственных веществ. Необходимо помнить, что всасывание веществ в этом случае будет более медленным, чем при какой-либо другой форме, применяемой при назначении *per os*, и что пилюли пригодны, следов., в тех случаях, когда не требуется быстрое наступление фармакологического эффекта. Назначение в форме пилюль нерационально при наличии ослабленной функции пищеварительного тракта, больным, находящимся в бессознательном состоянии и малолетним детям, которые большую частью не умеют их глотать. Пилюли непригодны также для назначения очень гигроскопичных веществ. Вес пилюль должен быть не менее 0,1 и не более 0,2.

В качестве пилюльной массы (*massa pilularum*) употребляют чаще всего смеси различных, не совсем индиферентных в фармакологическом отношении, растительных экстрактов и порошков подходящей консистенции, задача которых не только служить в качестве *constituentis*, но и усиливать (обычно) желательное терапевтическое действие. Чаще всего для этой цели используются: *Extr.* и *Pulv. rad. Liquiritiae* (фармакологически наиболее индиферентны), *Extr.* и *Pulv. folior. Trifoli fibrini*.

(горечь), Extr. и Pulv. Calami (горечь; не содержит дубильных веществ, почему удобен для выписывания с алкалоидами и железом), Extr. Gentianae (горечь), Extr. Taraxaci (горечь), Extr. Absinthii (горечь), иногда Piper nigri (но в небольших дозах); неплохие пилюли дают медицинское мыло (Sapo medicatus). Несомненно удобен в качестве чилюльной массы сухой экстракт адрожжей (Ext. r. Faecis siccum) с добавлением небольших количеств воды и глицерина, например:

Rp.: Creosotii 2,5

Extr. Faecis siccii
et Glycerini q. s.
ut fiat pH. № 100.
D. S.

Rp.: Ferri reduciti 5,0

Extr. Faecis siccii 15,0
Aq. destill. et Glycerini
q. s. ut f. pil. № 100.
D. S.

Если главное действующее вещество представляет собой порошок, то выписывается обычно только один растительный экстракт. Если же оно обладает густой консистенцией, то можно выписать, воборот, один растительный порошок без экстракта. Нерациональны прописи с воском—такие пилюли крайне плохо или даже совсем не распадаются в пищеварительном канале. Нельзя также рекомендовать употребление в качестве порошка жженой магнезии (Magnesia usta).

В случаях несовместимости действующих веществ с обычными чилюльными массами, в качестве такой употребляют обычно каолин (белая глина—Argilla alba s. Bolus alba) с добавлением глицерина и воды, иногда сахарного сиропа:

Rp.; Argenti nitrici 0,3
Boll albi et
Aq. glycer. (s. Aq. destill.)
q. s. ut f. pil. № 30.
D. S.

В случаях, когда начинающий врач затрудняется в выборе пилульной массы, он может предоставить выбор ее фармацевту, указав на это в рецепте: Massae pilularum q. s. ut f. pil. № Однако, едва ли это вообще желательно.

Мягкие лекарственные формы

Мази служат для различных целей: 1) для защиты патологически измененных участков ткани, чаще всего кожи, от вредных внешних воздействий; 2) для воздействия тем или иным лекарственным веществом на определенный участок кожи; 3) для введения лекарственного вещества в организм через кожу. В зависимости от назначения мази выбирается и соответствующая мазевая основа. Наиболее в качестве таковых служат для мазей первой и второй группы *Vaselineum album* и *Paraffini* (химически индифферентен, стоек), *Ung. Paraffini* (1 ч. твердого + 4 ч. жидкого парафина; нежная основа), *Ung. Glycerini* (крахмал, глицерин и вода, нежная основа); для третьей группы мазей обычно пользуются ланолином (*Lanolinum hydricum*, содержит до 50% воды и может служить основой *per se*; при назначении *Lanolinum anhydriticum* к нему приходится прибавлять до 50% вазелина, или до 30% оливкового масла, причем последнее лучше, так как оно и понижает стойкость ланолина, но зато не уменьшает заметно его проникающую способность, что дает прибавление вазелина); при назначении мази не более чем на несколько

дней может быть использовано очищенное свиное сало, *Axungia porci s. Adeps suillus depuratus*.

Важным вопросом при назначении мазей является вопрос о количественном соотношении лекарственных веществ и мазевой основы, так как вводимое в основу вещество может разжижать мазь и т. н., наоборот, сгущать; в первом случае получится уже линимент, а во втором—паста. Здесь необходимо учитывать следующее: нерастворимые в мазевой основе неорганические соединения, а также ихтиол могут быть введены до 50 весовых проц. ее; большая часть твердых органических соединений (резорцин, хризаробин, пироаллол и т. п.), растительные порошки, сухие экстракты и смолы—до 30 весовых проц.; растворимые соли, коллоидные препараты металлов, густые жидкости и экстракты, бальзамы и вообще большая часть полужидких веществ—до 25%; все возможные жидкие органические вещества (хлороформ, спирт и пр.)—до 15%. Особняком стоят такие вещества, как креозот, гвайкол, камфора, эфирные масла—их можно прибавлять до 10%.

В качестве исправляющих запах мазей используются обычно в количестве 1 капли на 5,0 мази: *Ol. Bergamotiae*, *Ol. Rosae*, *Ol. Cinni* и пр.

Общее количество мази, которое можно назначать, не должно превышать 50,0—100,0 при наружном, и 5,0—10,0 для применения на слизистых (глаз, нос).

Линименты. Официальные линименты могут быть использованы для назначения более сложных проприй путем призвивания к ним необходимых лекарственных веществ. Можно, разумеется, выписывать жидкие мази и на других основах. В качестве последних чаще всего служат различные жидкие жирные масла—*Ol. olivarum*, *Ol. Hipp* и пр., а также жидкий вазелин—*Ol. vasellini*. Выбор восприемлющего

определяется главным образом растворимостью в нем действующего вещества.

Обычные мазевые основы также могут служить для приготовления жидких мазей, если к ним добавить растворяющее их жидкое масло. В зависимости от состава мазевой основы приходится добавлять последнего 1:1 или 3:1 часть твердого жира.

Жидкие лекарственные формы

Дозирование их. Растворы, инфузии, декокты, различные микстуры обычно дозируются ложками. Обычного размера ложки вмещают жидкости:

| | |
|----------------|-----------|
| чайная . . . | 4,0—5,0 |
| десертная . | 8,0—10,0 |
| столовая . . . | 15,0—16,0 |

Стакан обычно вмещает 180,0—200,0 воды.

Тинктуры, жидкие экстракты и пр. дозируются обычно каплями. Дозирование это очень не точно, так как величина капли зависит от ряда условий. При применении нормальной капельницы можно составить себе несколько более точное представление о числе капель в 1,0 того или иного жидкого лекарственного средства. Однако, даже и в этом случае между данными разных авторов существует ряд расхождений.

Приведим данные о числе капель в 1,0 наиболее часто применяемых лекарственных веществ и препаратов:

Ac. muriat. dil. 20.

Ac. sulfur. dil. 20.

Aether aethylicus 84.

Alcohol absolut. 65.

Amylum nitrosum 55—65.

- Aqua destill. 20.
- Aq. menthae 24.
- Bals. Copaivae 38.
- " peruvian. 32.
- Benzin. petrol. 71.
- Bromoform. 38.
- Chloroform 55.
- Elixir acidi Halleri 50.
- Extr. hydrast. canad. fl. 55.
- " secalis cornuti fl. 34.
- Formaldeh. solut. 30—32.
- Glycerin 26.
- Kreosot 39.
- Liq. ammon. anis. 55.
- Liq. ammon. caust. 23.
- Liq. ferri sesquichlor. 18.
- Liq. Kalii acetici 22—23.
- Liq. Kalii arsenicosi 30—32.
- Nitroglycerin. Sol. Spirit. 1% 62.
- Ol. anisi 40.
 - " camphorat. 45.
 - " Cinnamomii 36—39.
 - " Citri 51—53.
 - " Foeniculi 44.
 - " Lavandulae 52.
 - " Lni 46.
 - " Menti ae pip. 51.
 - " Olivarum 12.
 - " Ricini 44—45.
 - " Santali 41.
 - " Sinapis aether. 43—44.
 - " Terebinth. rectif. 54.
- Paraffinum liq. 45—52.
- Paraldehyde. 57.
- Phenol. liquefact. 36.

| | |
|----------------------|--------|
| Pix liquida | 86. |
| Sirupus ferri Jodati | 19. |
| simp. | 18—20. |
| Spir. Vini 95-96,8° | 65. |
| " 90° | 60—61. |
| " 70° | 55—56. |
| " aetheris nitrosi | 59—60. |
| Tinct. Aloës | 54—60. |
| " Arnicae | 54. |
| " Aurantii | 54—56. |
| " Belladonnae | 50—55. |
| " Chinae | 54. |
| " Chinae comp-s. | 54. |
| " Digitalis | 54—55. |
| " Hyoscyami | 54—55. |
| " Jodi | 10—61. |
| " Menth e pip. | 50. |
| " Opii benzoic. | 50—54. |
| " Opii crocata | 45—52. |
| " Opii simpl. | 45—55. |
| " Strophanthi | 54—56. |
| " Strychni | 54—56. |
| " Valerian. simpl. | 54—56. |
| " Valerian. aether. | 63—64. |

В общем можно сказать, что если число капель воды (20) в 1,0 принять за единицу, то для жирных и эфирных масел оно больше в 2—2½ раза (40—50); для спирта и спиртовых препаратов примерно в 3 раза (ок. 60); для эфира и препаратов из него—в 3½—4 раза (до 70—80).

При дозировании жидких лекарственных форм необходимо обращать внимание еще на следующие моменты.

При назначении растворов различных лекарствен-

ных веществ, дозы которых сравнительно велики, между весом полученного раствора, поскольку растворитель отвешивается, а не отмеривается по объему, и его объемом получается некоторое несоответствие; поскольку большой обычно дозирует такой раствор по объему, точность дозировки несколько страдает. В самом деле:

Rp.: Kalii bromati 8,0
Aq. destillatae 200,0.
M. D. S.

Rp.: Kalii bromati 8,0
Aq. destillatae ad 200,0
M. D. S.

При изготовлении подобного рода прописей фармацевт в первом случае возьмет 200,0 воды и общий вес будет = 208,0, во втором же общий вес будет = 200,0. При наличии не слишком больших количеств взятой соли эти отклонения при дозировании столовой ложкой не будут иметь большого значения. Другое дело, если выписывается большое количество растворимых ингредиентов в малом объеме, например:

Rp.: Kalii iodati 5,0
Aq. destillat. 20,0
M. D. S.

Здесь уже получается трудно учитываемое и могущее иметь значение расхождение между весом и объемом. В силу этого гораздо целесообразнее назначать растворитель не по весу, а по объему.

Rp.: Kalii iodati 8,0
- Aquae destillatae ad
Volumen (до объема) 200 см³.

В этом виде дозировка становится достаточно точной.

Далее, необходимо уделять должное внимание точности формулировок при прописывании таких официальных препаратов, которые содержат определенное количество растворенного вещества, как, напр., буровская жидкость, свинцовый уксус, формалин, перекись водорода. Прописи: *Sol. Formalini* 10% и *Sol. Formaldehyd.* 10%—не одно и то же: в первом случае фармацевтом расчет будет производиться именно на формалин, который будет разведен им в 10 раз, тогда как во втором—на содержащийся в этом формалине в количестве 40% формальдегид; в первом случае при переводе на действующее начало, т. е. формальдегид получится 4% раствор его, а во втором 10%.

Жидкими лекарственными формами следует пользоваться главным образом в тех случаях, когда они удобнее для приема (дети, старики, тяжело больные и пр.); в случаях, когда необходим относительно быстрый терапевтический эффект и, наконец, когда лекарственное средство в силу своих физико-химических свойств наиболее рационально может быть использовано именно в растворах.

При назначении этих форм необходимо учитывать: 1) возможность более легкого изменения лекарственных веществ под влиянием света и воздуха (разложение и т. п.); 2) максимально удобные условия для химического взаимодействия между входящими в микстуру ингредиентами—нередко комбинация, совместимая еще в сухом виде, совершенно несовместима в растворе; 3) возможность изменения концентрации действующих веществ при длительном хранении ряда препаратов у больных в силу испарения значительных количеств раствора-

рителя (спирт, эфир), что особенно нежелательно в отношении тинктуру с сильно действующими, ядовитыми срелствами (морфий и пр.); 4) легкая возможность порчи многих прописей, содержащих органические вещества, особенно сахар, прибавленный с сиропами, вследствие развития процессов брожения. В силу этого не следует назначать за раз больших количеств этих препаратов; так, растворы, назначаемые каплями (тинктуры и пр.), не следует, обычно, назначать в количествах, больших чем 20,0—30,0; растворы различных веществ, дозируемые чайными, десертными и столовыми ложками—соответственно 60,0—80,0, 10,0—120,0 и 180,0—200,0. Необходимо помнить, что долгое хранение инфузий и декоктов, даже без наличия в них в качестве исправляющего вкус сахарного сиропа, влечет за собой быструю их порчу и разрушение действующих начал; особенно легко разрушаются глюкозиды растворений группы наперстянки. Задержать брожение можно прибавлением хлороформа (2—3 капли на 100,0 микстуры).

Вследствие того, что в инфузиях и декоктах и без того уже обычно содержится довольно сложный комплекс веществ, не следует, во избежание трудно определимой несовместимости, без особой нужды вводить в них другие ингредиенты.

При назначении жидких лекарственных форм не всегда удачны бывают попытки исправить неприятный запах и вкус их. Неудачи эти возникают чаще всего или потому, что вводится *cognitens*, еще более ухудшающий эти качества (напр., прибавление сиропов к иоду и салициловой кислоте), или же исправляющий препарат по своим свойствам несовместим с ингредиентами раствора, иногда химически, иногда же с точки зрения фарма-

колоидической. Corrigens обычно прибавляется в количестве 10—20% назначаемого раствора. Каких-либо точных правил в отношении назначения corrigens в тех или иных случаях не существует—врач должен здесь руководствоваться всеми данными химии и фармакологии; однако, все же следует указать, что: 1) вкус кисло-реагирующих растворов должен исправляться кислым же или нейтральным corrigens, точно так же как щелочные—щелочными или нейтральными; 2) горький вкус большинства микстур легче всего может быть исправлен ароматическими corrigentia.

Наиболее употребительные corrigentia.

- 1) Sirupus simplex (нейтр. р.).
- 2) Mel depuratum (слабо-кислая р.).
- 3) Sirup. Rubi Jdaeji (кислая р.).
- 4) " Cerasorum (кислая р.).
- 5) " Citri (кислая р.).
- 6) " Sennae (послабляет).
- 7) " Jp. cacauih. (отхарк.).
- 8) " Sen gae (отхарк.).
- 9) " Althaeae (отхарк.).
- 10) " Liquiritiae (отх; щелочной реакции).

Ароматические и горько-ароматические corrigentia:

- 1) Sirup. Menthæ piper.
- 2) Tinct. Menthæ piper.
- 3) Sirup. Cotr. Aurantii (слабо-кислая р.).
- 4) Tinct. cotr. Aurantii.
- 5) Sirup. Cinnamomi (много дубильных веществ).

Применяют также Aquae Cinnamomi, Menth. pip., flor. Aurantii и т. п., хлороформ, сахарин (в количестве 0,01—0,02%), иногда сахар; последние два передко с одновременным добавлением ac. citrici или ac. tartarici.

Наиболее употребительные обволакивающие средства (Mucilaginous):

Mucilago Amyli trifolia, Mucilago Salep., Muell. gummi arabici и некоторые другие.

Прибавляются они обычно в количестве 20—30 и больше процентов.

Эмульсии являются формой, весьма легко разрушающейся от самых различных веществ, быстро портящейся, в которой никогда не следует выписывать сильно действующие вещества.

ХИМИЧЕСКИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ И НЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

В ниже приводимый перечень химически несовместимых и нерациональных комбинаций лекарственных веществ включены только такие чаще встречающиеся комбинации, при изготовлении которых имеет место или потеря ингредиентами их физико-химических свойств, с которыми связано фармакологическое действие, или невозможность получения заданной врачом формы, или же при изготовлении их имеют место бурно протекающие химические реакции.

К первой группе относятся случаи разрушения действующих агентов, выпадение в виде осадков, образование новых соединений и т. п.

Ко второй—случаи образования расплывающихся, гигроскопичных порошков, одновременного назначения несмешивающихся жидкостей.

К третьей—случаи образования взрывчатых или воспламеняющихся смесей.

Необходимо отметить, что указанные в перечне групповые реакции допускают в отдельных случаях

исключения; так, например, соли алкалоидов, как слабых оснований, нерационально выписывать со щелочами; это верно в подавляющем большинстве случаев, особенно для растворов. Но назначение, скажем, чистого кодеина с бикарбонатом натрия в форме порошков вполне возможно, так как в данном случае употребляется основание, а не соль. Другим примером может служить комбинирование алкалоидов с иодом—последний дает осадки с подавляющим большинством алкалоидов, но не с дериватами пурина (гр. кофеина).

Таким образом приводимый перечень имеет своей целью дать схематическое представление о несовместимости лекарственных веществ и помочь врачу, особенно начинающему, избежать наиболее грубых ошибок.

Adonis vernalis—см. „глюкозиды”.

Адреналин. Cave (берегись, остерегайся): щелочей, Fe_2Cl_8 , уксуснокислого натра, гуммиарабика (оксидаза).

Азотистая кислота, ее соли и производные (анил-нитрат и пр.). Cave: алкалоидов (окисление), антипирина (соедин. зеленого цвета); препаратов, содержащих Ј и Вг (выделение последних).

Азотная кислота. Cave: алкоголя, глицерина, молочной кислоты, фенола, эфирных масел—взрыв!

Азотно-кислое серебро. Cave: бромистых, иодистых, хлористых и уксуснокислых солей, соляной кислоты, щелочей, танина—осаждение; алкалоиды, глюкозиды, углеводы, дериваты бензола, белок и пр. органические вещества (возможен взрыв при растворении).

Алкалоиды и содержащие их препараты. Cave: Aqua amygdal. amar., Aqua Laurocerasi, танин и содержащие его препараты (осаждение); щелочи и

щелочно-реагирующие препараты (Liq. arsenicalis Fowleri, Liq. ammon. anisat. и пр.)—осаждение (кроме Codein. rugum и Extr. Belladonn. с одним Na₂bi-carbonic., но не с сахаром—с последним масса сыреет и щелочь переводит соль атропина в нерастворимое основание); соли Hg и др. тяжелых металлов, J и иодистые соли—осадки (кроме пр. кофеина); азотистая кислота и ее соли, KMnO₄, H₂O₂—окисление; фосфорнокислый натрий, Rheum, Extr. и Succus Liquiriti.—осаждение.

Алкоголь и содержащие его препараты Cave: белки, гумми—осаждение; бертолетова соль, KMnO₄, пикировая и хромовая кислоты—взрыв!

Амил-нитрит—см. „азотистая кислота”.

Антипирин. Cave: азотистая кислота и ее производные—образование ядовитого соединения зеленого цвета; танин, щелочи—осаждение; иод, уретан—химическое соединение; соли железа—красное окрашивание; KMnO₄—окисление; сырьеющие, влажные массы с кофеином, резорцином, тимолом, салицилатами, хинином, хлорал-гидратом, антифебрином, фенолом.

Антифебрин. Cave: резорцин—разложение; фенол, тимол, антипирин, салицилаты, хлорал-гидрат—сыреющие, расплывающиеся массы.

Апоморфин. Cave: соли Fe, J, KMnO₄; щелочи и щелочно-реагирующие препараты (Liq. ammonii anisati и пр.); танин и содержащие его препараты; хинин, кофеин, Sir. и Succ. Liquiritiae.

Aqua amygdal. amara.—см. „горько-миндальная вода”.

Аспирин. Cave: щелочи и минеральные кислоты—разложение; соли Fe—окрашивание; уротропин—влажная масса.

Атропин и содержащие его препараты. Cave: кислоты, щелочи (см. „алкалоиды”).

Белковые препараты. Cave: танин, кислоты, соли тяжелых металлов, спирт—осаждение.

Бензонафтогл. Cave: жидкые смеси с антибиотиком, камфорой, спиртом, тимолом, хлорал-гидратом, терпин-гидратом.

Бертолетова соль—см. „хлорноватокислый калий”.

Бром. Cave: алкоголь—взрыв.

Бромистые соли. Cave: соли Hg и Ag—осаждение; крепкие кислоты, хлорал-гидрат—разложение; окислители—освобождение Br; паральдегид, пирамидон, каломель.

Бромистый стронций. Cave: Углекислые соли—осадок.

Веронал-натрий. Cave: солянокислый морфий; кисло-реагирующие препараты.

Виннокаменная кислота. Cave: соли железа—окрашивание.

Висмут азотнокислый основной (*Bismuth. subnitric.*). Cave: щелочи, алкалоиды и содержащие их препараты, *Aqua calcis*, танин и содержащие его препараты; *Argentum nitricum*, *Kalium chloricum*, марганцево-кислый калий.

Глицерин. Cave: бертолетова соль, $KMnO_4$, хромовая и никриновая кислоты, хлориновая известь—взрыв; хлорал-гидрат—разложение.

Глюкозиды (наперстянки, горицвета, ландыша, строфанта; арбутин, амигдалин). Cave: иод и иодистые соли, кислоты (HCl) и кисло реагирующие соли, щелочи—разложение; танин и содержащие его препараты, соли тяжелых металлов—осаждение.

Горькоминдальная вода. (*Aqua amygdalar. amar.*). Cave: алкалоиды; антибиотик—разложение; щелочи и щелочно-реагирующие препараты (*Liq. Kalii arsenical.*, *Liq. ammonii anisat.* и др.)—нейтрализация; HCN ; $KMnO_4$ и бертолетова соль—окисление.

Гуммиарабик. Cave: адреналин, пирамидон, танин—окисление их; апоморфин—разлагается и темнеет; сода, иод—разложение; хлорное железо и бура—студистая смесь; соли свинца—осадок.

Дионин. Cave: бромистый натр при одновременном растворении их—растворять оба препарата отдельно.

Диуретин. Cave: кислоты и кисло-реагирующие препараты, щелочи—разложение.

Дубильные кислоты Cave: алкалоиды, белки, глюкозиды и тяжелые металлы—осаждение их; щелочи—разложение.

Extr. Aloës, Extr. Rhei. Cave: щелочи—образование смоляных мыл.

Железо и большая часть его соединений. Cave: камеди (при Fe_2Cl_6), слизистые вещества, танин, щелочи и щелочно-реагирующие препараты; салициловая кислота и ее соли—окрашивание; иод и иодистые соли—химическое соединение; Liq. arsenicalis Fowleri—осадок.

Железный альбуминат. Cave: щелочи, щелочно-реагирующие препараты, кислоты, хлористый натр; см. также „железо“.

Иод. Cave: As_2O_3 —нерасторимый осадок; аммиак и его соли, эфирные масла, Hydrarg. praecip. album—взрывчатые и в спламеняющиеся смеси.

Иодистые соли. Cave: алкалоиды, соли Hg и Ag, бертолетова соль, $KMnO_4$, Fe_2I_6 —осадок; азотистая кислота—выделение J; крепкие кислоты—разложение.

Иодистые препараты органические (иодоформ и пр.). Cave: соли азотистой кислоты, $KMnO_4$,—окисление; соли азотной кислоты—выделение J; щелочи—разложение; соли Hg и $AgNO_3$ —осадок.

Ихтиол. Cave: Liq. aluminum acetici (грязная хлопчатая масса); алкоголь, эфир, щелочи, кислоты, иод и иодистые соли.

Каломель. Cave: бромистые, иодистые, хлористые и виннокаменно-кислые соли, кислоты (в частности лимонная и уксусная), органические вещества (сахар!), аммиак, NH_4Cl , щелочи (бикарбонат!)—разложение; Aq. amygdalar. amaral., антипирин, Bismuth. sibnitricum, сахарин—ядовитые соединения.

Камфора. Cave: бета-нафтол, пирогаллол—химические соединения; ментол, фенол, резорции, салол, тимол, хлорал-гидрат, уретан—жидкие смеси.

Карболовая кислота. Cave: бромистые и иодистые соли, соли железа, KMnO_4 , щелочи; нафталин, хлорал-гидрат, ментол, камфора, жаропонижающие ароматического ряда.

Кислоты (особенно минеральные) и кисло реагирующие соли. Cave: щелочи и щелочно реагирующие препараты—нейтрализация; соли более слабых кислот (NaBr , salicylic., NaBr . benzoic., KJ, NaBr и др.)—выделение этих кислот в свободном виде; глюкозиды—разложение; тяжелые металлы и их окиси—образование хорошо растворимых прижигающих солей; п; препараты, содержащие белковые вещества; эмульсии.

Кодеин и его соли. См. „алкалоиды“ (Codeinum rigitum может быть назначаем с NaBr . bicarbon.).

Кокайн. Cave: коллоидальные препараты серебра; см. „алкалоиды“.

Convallaria majalis—см. „глюкозиды“.

Кофеин и его соли. Cave: антипирин, сахар—влажная масса; Extr. chinæ, танин—осадок; минеральные кислоты и кислые сиропы (Sirup. Citri, Sir. Rubi Jdae)—разложение; Coffein. natr. salicyl. нельзя выписывать с пантопоном—выделение из последнего наркотика.

Линименты. Cave: кислоты и кислые соли, соли Ca , Mg и Al ; при аммиачном линименте—также свободный J.

Liq. arsenical Fowleri—см. „мышьяковистая кислота“.

Liq. ferri albuminati—см. „железный альбуминат“.

Магнезиальные соли. Cave: фосфорокислые и углекислые соли.

Марганцевокислый калий. Cave: органические вещества—окисление их и восстановление K_2NO_4 ; легко окисляющиеся неорганические соединения—соли HNO_2 , фосфорокислые соли, $FeSO_4$ и др.

Ментол. Cave: фенол, резорцин, тимол, пирогаллол, хлорал-гидрат, бетанафтол, салол, камфора—влажная масса.

Металлические соли. Cave: танин, алкалоиды и глюкозиды, щелочи, белки, экстракты и настойки, мыла.

Морфий и его соли. Cave: соли Hg и Ag , танин и содержащие его препараты, щело и, *Liq. ammon.*, *an sat.*, *Aq. Laurocerasi*, *Aq. amygdal.* агар.—осаждение; соли Fe —восстановление; $KMnO_4$ —окисление; азотистые соли—красное окрашивание.

Мышьяковистая кислота (As_2O_3) и ее соли. Cave: гуммиар бик, белковые препараты, $AgNO_3$, *J*, *KJ*—окисление; стрихнин и содержащие его препараты (*Tinct. пис. vomic.*)—дегтеобразный осадок.

Наперстянка—см. „глюкозиды“.

Натрий двууглекислый. Cave: соли алкалоидов, соли металлов—осаждение; кислоты и кислые соли—выделение CO_2 . См. также „щелочи“.

Наftалин. Cave: салол, тимол, фенол—жидкие массы.

Нашатырный спирт. Cave: иод (образование иодистого зота, взрывающегося после высыхания!); см. „щелочи“.

Новокаин. Cave: соли Ag и Hg , щелочи—разложение; $KMnO_4$ —окисление; танин—осадок; коллоидальные препараты Ag ; см. также „алкалоиды“.

Пепсин. Cave: алкалоиды, соли металлов, тинктуры (алкоголь!)-осадок; щелочи—прекращение действия.

Пирамидон. Cave: гуммиарабик—окисление; апоморфин—разложение; соли тяжелых металлов—разложение с окрашиванием; хлорал-гидрат, резорцин—влажная масса.

Протаргол—см. „серебряные препараты“.

Резорцин. Cave: ментол, камфора, фенол, антипирин, пирамидон, салицилаты—влажная масса; щелочи, иодистые соли, соли металлов—разложение.

Ртуть, ее соли. Cave: алкалоиды, танин и содержащие их препараты, органические вещества, щелочи—осадок; бромистые и иодистые соли—химическое соединение; см. также „каломель“.

Салицилаты. Cave: щелочи—осадок, соли Fe; антипирин и другие жаропонижающие ароматического ряда, хлорал-гидрат, резорцин, камфора, фенол, тимол, нафталин.

Салол. Cave: антипирин, хлорал-гидрат, нафталин, камфора—жидкие смеси.

Серебряные препараты коллоидальные. Cave: танин и содержащие его препараты, щелочи; хлористые, иодистые и бромистые соли, новокаин, кокain, сернокислый цинк—осаждение; перекись водорода. „Азотнокислое серебро”—см. его.

Сода двууглекислая. См. „натрий двууглекислый“

Stibium sulfurat. aurant. Cave: камфора—разложение.

Стрихнин и содержащие его препараты (Tinct. sicc. vomic. и др.). Cave: кроме указанных при алкалоидах, также Sol. arsenic. Fowler (дегтеобразный осадок), фосфаты.

Танин и содержащие его препараты—см. „Дубильные кислоты“.

Танинъльбин. Cave: золотохислый и салициловокислый висмут—нерасторимое соединение.

Уротропин. Cave: аспирин (в порошке—распыляющаяся смесь; можно в растворе); антипирин, танин и содержащие его препараты; кислоты.

Фенацетин. Cave: хлорал-гидрат—влажная масса.

Фенол—см. „карболовая кислота”.

Физостигмин—см. „алкалоиды”.

Фовлеров раствор. Cave: *Liq. ferri albumin.*, *Tinct.*, *ferri rotundi*—осадок; см. также „мышьяковистая кислота”.

Хинин и его соли. Cave: кроме указанных при алкалоидах также соединения As, салицилаты—осадок; аспирин—ядовитое соединение (при длительном хранении?); антипирин, мочевина, уретан—мокнущие порошки.

Хлорная известь. Cave: сера, NH_4Cl , NH_3 , глицерин, жиры, эфирные масла—воспламенение и взрыв!

Хлорноватокислый калий (бертолетова соль). Cave: иод, сера, фосфор, уголь и всевозможные органические вещества, KMnO_4 , пикриновая и хромовая кислота—взрыв!

Хлорал-гидрат. Cave; фенацетин и др. жаропонижающие ароматич. ряда; салицилаты; бензояфтол; камфора, ментол, тимол, фенол; глицерин, бромистые и иодистые соли.

Цинк сернокислый. Cave; *Plumbum aceticum*, протаргол—осадок; см. также „металлические соли”.

Черногорка—см. „глюкозиды”.

Щелочи. Cave: кислоты и кислые соли—нейтрализация; соли алкалоидов, глюкозиды; соли металлов тяжелых и щелочно-земельных.

Эйхинин. Cave: кроме указанных при алкалоидах, также кислоты.

Лекарственные препараты, содержащие алкалоиды:

| | |
|--|-------------------------------|
| Cortex Chinae | Radix Ipecacuanhae |
| ” Granati | Rhizoma Veratri |
| Extr. Belladonnae | Secale cornutum |
| ” Chinae | Secalen |
| ” Hydrastis fluid. | Semen Colchici |
| ” Hyoscyami | ” Sabadillae |
| ” Opii | ” Strychni |
| ” Secalis cornuti | Sirupus Ipecacuanhae |
| ” Strychnis. nuc. vomic. | Tinct. Aconiti |
| Folia Belladonnae | ” Belladonnae |
| ” Hyoscyami | ” Chinae |
| ” Stramonii | ” Colchici |
| Fructus Papaveris immaturi | ” Lobeliae |
| Herba Conii | ” opii benzoica |
| ” Hyoscyami | ” crocata |
| Opium | ” ” simpl. |
| Pulvis Ipecacuanhae opia- tus (s. pulv. Doveri) | ” Strychni, s. nuc. vomic. |

Кисло реагирующие лекарственные препараты:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Acetum. | Chinum bisulfuricum и bimuriaticum |
| ” aromaticum | |
| ” pyrolignosum | Extr. Aloes (слабо-кислая реакция) |
| Aloë (слабо-кислаяreak- ция) | ” ferri pomat. (то же) |
| Alumen | ” Rhei compos. (то же) |
| Aluminium aceticum | Ferrum citricum oxydat. |


| | |
|--|--|
| Ferrum lacticum | Sirup. Aurantii (сл.-кислая реакция) |
| " sesquichlorat. | |
| " sulfuricum | Sirup. Rubi Idaeи (слабо-кислая реакция) |
| Hydrargirum bichloratum | Spiritus aetheris nitrosi |
| Liquor acidi Halleri | formicarum |
| " aluminii acetici | Tinct. ferri pomati |
| " ferri sesquichlorati | " gallarum |
| Mixtura sulfurica acida | " opii benzoica |
| Natrium salicylicum (сл.-кислая реакция) | Zincum sulfuricum |
| Oleum Santhali. | - |

Щелочно реагирующие лекарственные препараты:

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Ammoniacum | Magnesia carbonic. |
| Ammonium carbonicum | oxydat. |
| Aqua caicis | Natrium aceticum (слабо-щелоч. р.) |
| Borax | " boracicum |
| Calcium oxydatum | " phosphoricum |
| Diuretin | Plumbum aceticum basi-cum |
| Infusum Sennae compos. | Protargol (слабо-щелоч. реакция) |
| Kalium bicarbonicum | Sal. carolinum fistic. |
| " sulfuratum | Solutio arsenicalis Fowler |
| Lingimentum ammoniat. | Sirupus Liquiritiae. |
| " saponato- | Theobrominum natrio-sali-cicum |
| camphor. | Tinct. Rhei aquosa. |
| Liq. ammon. anisat. | |
| " kalii arsenicosi | |
| " plumbi subacetici | |
| Magnesia usta | |

Лекарственные препараты,
содержащие дубильные вещества:

| | |
|-------------------|----------------------|
| Chininum tannicum | Herba sabinæ |
| Cortex chinæ | Radix Rhei |
| " cinnamomi | " Valerianæ |
| " granati | Semen colchici |
| Extr. chinæ | " quercus |
| " filicis maris | Sirupus Rhei |
| " granati | Species aromaticæ |
| " Rhei | " laxantes |
| Flores arnicae | Tannalbinum |
| " sambuci | Tinct. Aloës compos. |
| " Tiliae | " Chinæ |
| Folia Salviae | " Colchici |
| " uvæ ursi | " Gallarum |
| Herba meliloti | " Rhei |
| " millefolii | " Valerianæ |



355728

Способы стерилизации некоторых препаратов

| № | Название препаратов | Способ стерилизации |
|----|--|---|
| 1 | Acidum arsenicosum | 115—120° в автоклаве |
| 2 | Adrenalinum hydrochloricum solutum | Асептич. приготовление |
| 3 | Alypinum | Растворить в кипящей воде |
| 4 | Antipyrinum | Текущий пар (100° С) |
| 5 | Apomorphinum hydrochloricum | Асептич. приготовление |
| 6 | Argentum colloidale (Collargolum) | То же |
| 7 | Atropinum sulfuricum | Тиадализация |
| 8 | Calcium chloratum | Автоклав при 115—120° С |
| 9 | Camphora | Текущим паром |
| 10 | Chininum muriaticum и все др. препараты | |
| 11 | Chloralum hydratum | Асептич. приготовление |
| 12 | Cocainum hydrochloricum | Тиадализация |
| 13 | Codeinum phosphoricum | |
| 14 | Coffeinum natr.-benz. et natr.-salicylic. | Текущим паром |
| 15 | Dioninum | |
| 16 | Extr. Secalis cornuti | Тиадализация |
| 17 | Gelatina alba | Дробная стерилизация при 100° С в течение 3 дней по 15 минут |
| • | | |

| № | Название препаратов | Способ стерилизации |
|----|-------------------------------------|---|
| 18 | Glucerinum | Автоклав при 115° С |
| 19 | Glycosa | Текущий пар (100° С) или дробная стерилизация при 70° |
| 20 | Hydrgyrum bijodatum | |
| 21 | " суапатум | } Текущий пар |
| 22 | " охусупатум | Асептич. приготовление |
| 23 | " salicylicum | Текущий пар |
| 24 | " chloratum (в масле) | То же |
| 25 | Jodoformium (в глицерине или масле) | Асептич. приготовление |
| 26 | Kalium bromatum | |
| 27 | " chloratum | } Текущим паром |
| 28 | " iodatum | |
| 29 | Mentholum | |
| 30 | Methylenum coeruleum | Автоклав при 115° С |
| 31 | Morphium, его соли | Текущим паром |
| 32 | Natrium arsenicicum | |
| 33 | " arsenicosum | |
| 34 | Natrium chloratum | Автоклав при 115° С |
| 35 | " iodatum | |
| 36 | " kakodylicum | Текущим паром |
| 37 | Neosalvarsanum | Асептич. приготовление |
| 38 | Novocainum | Текущим паром |
| 39 | Ol. vasellini | Автоклав при 115° С |
| 40 | Pantoponum (Отпоронум) | Тиндализация |

| № п/п. | Название препаратов | Способ стерилизации |
|--------|-----------------------------|------------------------|
| 41 | Physostigminum salicylicum | Асептич. приготовление |
| 42 | Pilocarpinum hydrochloricum | Тиндализация |
| 43 | Pyocyaninum coeruleum | Текущим паром |
| 44 | Scopolaminum hydrobromicum | Тиндализация |
| 45 | Stovainum | } Текущим паром |
| 46 | Strychninum nitricum | |
| 47 | Stypticinum | |
| 48 | Talcum | |
| 49 | Urotropinum | } Течущим паром |
| 50 | Veronalum-Natrium | |
| 51 | Zincum oxydatum | |
| 52 | Эмульсии | Асептич. приготовление |

**ВЫСШИЕ ДОЗЫ ОДНОКРАТНЫХ
И СУТОЧНЫХ ПРИЕМОВ
ЯДОВИТЫХ И СИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ**

(Согласно Государств. фармакопее СССР,
7-го издания тиража 1934 г.)

| | Высший одно- кратный прием | Высший суточн. прием |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| Acetanilidum | 0,3 | 1,0 |
| Acid. arsenicosum | 0,003 | 0,01 |
| " carbolicum purum | 0,1 | 0,3 |
| " hydrochloratum dilutum | 0,5 | 4,0 |
| Adrenalinum hydrochlor. solut. 1:1000 | 1,0 | — |
| Aethylum bromatum | 0,6 | — |
| Agaricinum | 0,1 | 0,2 |
| Ammonium bromatum | 2,0 | 9,0 |
| Amylenum hydratum | 3,75 | 7,5 |
| Amyllum nitrosum | 0,2 | — |
| Antipyritinum | 1,0 | 3,0 |
| H. Adonid. vernalis | 0,8 | 10,0 |
| Apomorphinum hydrochlor | 0,01 | 0,05 |
| Aq. amygdal. amar. | 2,0 | 6,0 |
| Arg. nitric. | 0,03 | 0,1 |
| Arbutin | 1,0 | 4,0 |
| Atropinum sulfuricum | 0,001 | 0,003 |
| Bismuthum salicylicum basicum | 1,0 | 3,0 |
| Bromoformium | 0,3 | 1,0 |
| Cantharides | 0,03 | 0,1 |
| Chinin. sulfuric. | 0,5 | 2,0 |

| | Высший однократный прием | Высший суточный прием |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Chloral-formamid | 3,75 | 7,5 |
| Chloral-hydrat | 2,0 | 6,0 |
| Chloroformium | 0,5 | 1,0 |
| Cocainum hydrochlor. | 0,03 | — |
| Codeinum | 0,05 | 0,2 |
| Codeinum phosphoricum | 0,1 | 0,3 |
| Coffeinum | 0,3 | 1,0 |
| Coffeinum natrio-salicyl. и n.-benz. | 0,5 | 2,0 |
| Dionin | 0,03 | 0,1 |
| Diuretinum | 1,0 | 6,0 |
| Extr. Belladonnae | 0,05 | 0,15 |
| " Cannabis indicae | 0,1 | 0,3 |
| " Filicis maris | 8,0 | — |
| " Hyoscyami | 0,06 | 0,3 |
| " Opii | 0,05 | 0,3 |
| " Secalis cornuti spissum . . . | 0,3 | 1,0 |
| " Secalis cornuti fluidum . . . | 1,0 | 3,0 |
| " Strychni | 0,03 | 0,10 |
| Fol. Belladonnae | 0,2 | 0,6 |
| " Digitalis | 0,2 | 1,0 |
| " Stramonii | 0,2 | 0,6 |
| Fructus Cologynthidis | 0,18 | 0,9 |
| Herba Conii | 0,2 | 0,6 |
| Herba Aconiti | 0,3 | 0,6 |
| H. Cannabis indicae | 0,2 | 0,6 |
| Heroin. hydrochloric. | 0,005 | 0,015 |
| Hedonal | 1,5 | 3,0 |
| Homatropinium hydrobrom. | 6,001 | 0,003 |

| | Высший одно- кратный прием | Высший суточн. прием |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Hydargyr. bidloratum | 0,02 | 0,06 |
| " bijodatum | 0,02 | 0,06 |
| " chloratum | 0,6 | 1,8 |
| " cyanatum | 0,01 | 0,03 |
| " salicylicum | 0,02 | 0,06 |
| Hydraſtinin. hydrochloric. | 0,03 | 0,1 |
| Jodoformium | 0,2 | 0,6 |
| Jodum | 0,02 | 0,06 |
| Kalium bromatum | 4,0 | 10,0 |
| " jodatum | 1,0 | 6,0 |
| Kreozotum | 0,5 | 1,5 |
| Liquor kalii arsenicosi | 0,2 | 0,6 |
| Luminal. | 0,3 | 0,6 |
| Morphium hydrochloricum | 0,03 | 0,1 |
| Nitroglycerinum s. Trinitrinum . . | 0,0005 | 0,0015 |
| Natrium arseniticum | 0,003 | 0,01 |
| " kakodylicum | 0,06 | 0,2 |
| Novocainum (подкожно) | 0,2 | — |
| Orthoformium | 1,0 | 3,0 |
| Opium | 0,10 | 0,3 |
| Ösarsol | 0,25 | 1,0 |
| Pantopon | 0,03 | 0,1 |
| Papaverinum hydrochlor. | 0,05 | 0,2 |
| Paraldehydin | 5,0 | 10,0 |
| Phenacetinum | 0,5 | 2,0 |
| Phosphorus | 0,001 | 0,003 |
| Physostigminum salicylic. | 0,001 | 0,003 |
| Pelletierinum tannic. | 0,8 | — |

| | Высший однократный прием | Высший суточн. прием |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Pilocarpinum hydrochlor. | 0,02 | 0,04 |
| Pituitrinum (подкожно) | 1,0 | — |
| Plumbum acetatum | 0,06 | 0,25 |
| Podophyllinum | 0,10 | 0,3 |
| Pulvis Doveri | 1,0 | 4,0 |
| Pyramidonum | 0,5 | 1,5 |
| Resorcinum | 0,5 | 2,0 |
| Radix Ipecacuanhae | 1,0 | — |
| Salipyrinum | 1,0 | 4,0 |
| Salol | 2,0 | 8,0 |
| Salophen | 1,0 | 6,0 |
| Santonin | 0,1 | 0,3 |
| Scopolaminum hydrobromicum | 0,0005 | 0,0015 |
| Secale cornutum | 1,0 | 5,0 |
| Semen Strychni | 0,1 | 0,3 |
| Stibio-kalium tartaricum | 0,1 | 0,3 |
| Strychnin. nitricum | 0,002 | 0,005 |
| Stypticinum | 0,1 | 0,3 |
| Sulfonalum | 2,0 | 4,0 |
| Sparteinum sulfuric. | 0,05 | 0,3 |
| Strophanthin | 0,001 | — |
| Tartarus stictatus | 0,1 | 0,3 |
| Theocinum | 0,5 | 1,5 |
| Thyreodinum | 0,3 | 1,0 |
| Tinct. Aconiti | 0,5 | 1,5 |
| " Belladonnae | 0,5 | 1,5 |
| " Cantharidum | 0,2 | 0,6 |
| " Cannabis Indicae | 1,25 | 3,75 |

| | Высший одно- кратный прием | Высший суточн. прием |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Tinct. Colchici | 1,8 | 5,6 |
| " Convallariae majalis | 1,25 | 3,75 |
| " Digitalis | 1,0 | 3,0 |
| " Ipecacuanhae | 2,0 | 4,0 |
| " Jodi | 0,2 | 0,6 |
| " Lobeliae | 1,0 | 3,0 |
| " Opii simplex | 1,0 | 3,0 |
| " Opii benzoica | 4,0 | 12,0 |
| " Opil crocata | 1,0 | 3,0 |
| " Strophanthi | 0,5 | 1,5 |
| " Strychni | 1,0 | 3,0 |
| Veronalum | 0,75 | 1,5 |
| Zincum sulfuric. (как рвотное) . . | 1,0 | — |

Примечание. Для детей высшие дозы уменьшаются приблизительно так:

для молодых людей 18 лет $\frac{3}{4}$ дозы взрослых
 " детей 14 $\frac{1}{2}$ " " "
 " 7 лет $\frac{1}{3}$ " "
 " 6 " $\frac{1}{4}$ " "
 " 4 " $\frac{1}{6}$ " "
 " 2 " $\frac{1}{8}$ " "
 " 1 года $\frac{1}{12}$ " "
 " до 1 " $\frac{1}{12} - \frac{1}{24}$ " "
 " до $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{45}$ " "

Для лиц старше 60 лет высшие дозы уменьшаются до $\frac{3}{4}$ и $\frac{1}{2}$ приема взрослых.

ДОЗИРОВКА НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИ

(Первая строка на 1 прием,

| Название лекарства | От 6 мес. до 1 года |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Ammonium bromatum | 0,03—0,05 0,1—0,15 |
| Acidum muriaticum dilut. purum . . | 1/2—1 кап. 2—3 кап. |
| Antipyrinum | Избегать. |
| Aspirinum | " |
| Aqua amygdalatum amarar. | ¼—1 кап. Осторожно. |
| Belladonnae tinctura | На сутки: |
| Benzonaphtholum | 0,03—0,05 0,06—0,1 |
| Bismuthum subnitricum | д. те же |
| " " | " |
| " salicylicum | " |
| Chininum muriaticum | 0,03—0,05 0,06—0,1 |
| Chloralum hydratum | 0,02—0,05 0,06—0,15 |
| Camphora | 10% раствор ¼ — ½ см ³ |

ТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ ПО ВОЗРАСТАМ

(вторая—на сутки)

| 1—2 лет. | 4—6 лет. | 8—10 лет. | 12 лет |
|--|--|---|--|
| 0,05—0,1 0,2—0,4 1—3 кап. 4—10 кап. 0,05—0,1 0,1—0,2 Те же | 0,15—0,2 0,6—0,8 4—6 к. 12—20 к. 0,15—0,25 0,3—0,5 дозы. | 0,25 1,0—1,2 8 25 0,3 0,6 Те же | 0,3 1,5—2,0 10 кап. 30 кап. 0,5 1,0 дозы. |
| 1—2 кап. 5—10 кап. | 3—4 к. 12—16 к. | 5— 20— | 10 кап. 40 кап. |
| 1—2 кап. 0,05—0,1 0,15—0,3 0,1—0,15 0,3—0,45 | 3—5 к. 0,15—0,2 0,45—0,6 0,2—0,25 0,6—0,75 | 10 0,25 0,75 0,3 0,9 | 15 кап. 0,4 1,2 0,5 1,5 |
| 0,05—0,1 0,15—0,3 0,05—0,1 0,1—0,2 0,05—0,1 0,15—0,3 в миндал. до $\frac{3}{4}$ см ³ . | 0,15—0,2 0,45—0,6 0,15—0,25 0,3—0,5 0,15—0,25 0,45—0,75 или очищ. 1 см ³ . | 0,25 1,0 0,3 0,6 0,3 1,5 пров. мас. $20\%-1$ см ³ | 0,3 1,2 0,5 1,0 0,5 2,0 подкожно. от 2 до 6 раз в сутки. |

| Название лекарства | От 6 мес. до 1 года |
|--|------------------------|
| Coffeinum natrio-benzoicum | 10% водный |
| Codeinum purum | Не следует |
| Calomel (слабительное) | 0,03—0,05 0,06—0,1 |
| Calcium bromatum seu chloratum . . . | 0,03—0,05 0,1—0,15 |
| Cascarae sagradae extract. fluid. | — |
| Dioninum | — |
| Diuretinum | 0,03—0,05 0,06—0,1 |
| Duoatalum | — |
| Filicis maris extract. aether. | — |
| Ferrum lacticum | — |
| Ferrum jodatum sacharat | — |
| Ipecacuanhae rad | Infusum ex |
| Kalium bromatum | 0,03—0,05 0,1—0,15 |

| 1—2 лет. | 4—6 лет. | 8—10 лет. | 12 лет. |
|---|---|---|---|
| раствор 2—3 делен. от 2 назначать | под кожно до 0,5 к. с. до 4 раз 0,004—0,005 0,008—0,01 | до 1 к. с. в сут 0,008—0,01 0,016—0,02 | и больше ки. 0,015 0,03 |
| 0,1×2 Через 2 ч. от 1 чай 0,1—0,13 0,3—0,4 — | 0,15×2 по порош. ной до стол овой лож. 0,15—0,2 0,45—0,6 10—15 кап. | 0,2×2 после чего 20—25 кап. | 0,2×2 ol. ricini — 0,3 1,0 30 кап. |
| — | 1% вод. раствор reg os по 4—6 кап. | 8 кап. | 2 раза в день 10 кап. |
| 0,1—0,15 0,2—0,3 0,05—0,1 0,1—0,2 — | 0,2—0,25 0,4—0,5 0,15—0,2 0,3—0,4 2,0 | 0,3— 0,6— 0,25— 0,5 — 2,5—3,0 | 0,5 1,0 0,3 0,6 —4,0 |
| 0,03—0,05 0,06—0,1 0,03—0,05 0,06—0,1 0,05—0,1 | 0,1—0,15 0,2—0,3 0,1—0,15 0,2—0,3 0,15— | 0,2—0,25 0,4—0,5 0,2— 0,4— 0,2— | 0,3 0,6 0,25 0,5 0,25 pto 100,0 |
| По чайн. лож. от 2 до 6 раз по десертн. лож. | 2—3 раза | | |
| 0,05—0,1 0,2—0,3 | 0,15—0,2 0,5—0,6 | 0,25 0,8—1,0 | 0,3 1,5 |

| Название лекарства | От 6 мес. до 1 года |
|----------------------------------|---------------------------|
| Kalium jodatum | 0,01—0,02 0,03—0,06 |
| Kamala | — |
| Liquor Ammonii anisati | 1/4—1 к. 1 к.—4 к. |
| " anodynus Hoffmanni | ½—1 к. 2—5 к. |
| Magnesia cum rheo | 0,05—0,1 0,1—0,2 |
| Morphium muriaticum | Не назна " |
| Natrium bromatum | 0,03—0,05 0,1—0,2 |
| " bensoicum | То же |
| " salicylicum | — |
| " jodatum | — |
| Naphtalinum purum | — |
| Natrium arsenicicum | — |
| Oleum jecoris aselli | ½—1 ч. л 2 раза в день |

| 1—2 лет. | 4—6 лет. | 8—10 лет. | 12 лет. |
|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 0,03—0,05 | 0,1—0,15 | 0,2—0,25 | 0,3 |
| 0,1—0,15 | 0,3—0,5 | 0,6—0,8 | 1,0 |
| 1,0 | 2,0—3,0 | 4,0—6,0 | —10,0 |
| В 2—3 | приема с медом | | |
| 1 к.—2 к. | 3—4 к. | 5—6 | 8 капель |
| от 2 | до 4— | 6 раз | в сутки |
| 1—2 к. | 3—5 к. | 6—8 | 10 капель |
| от 2 | до 4— | 6 раз | в сутки |
| 0,1—0,15 | 0,2—0,25 | 0,3, | 0,5 |
| 2 раза | в сутки | 2 раза | в сутки |
| чать! | Раствор 0,01—0,02 : 10,0 | по столько | |
| — | капель, сколько ребенку лет на прием, | | |
| | 2—3 раза в день. | Осторожно! | |
| 0,1—0,15 | 0,2—0,25 | 0,3 | 0,5 |
| от 2 | до 4 | раз в | сутки |
| 0,05—0,1 | 0,15—0,2 | 0,25 | 0,3 |
| до 4 раз | в сутки | до 4 раз | в сутки |
| Т о | же | Т о | же |
| 0,03—"0,05 | 0,1—0,12 | 0,15—0,2 | 0,25 |
| 2 раза | в сутки | 2 раза | в сутки |
| Т о | же | Т о | же |
| 1% водный | раствор — | подкожно | |
| от 1 до 3 | от 1 до 5 | от 2 | до 1 см ³ |
| дел. | дел. | | |
| от 2 до 4 | раз в | сутки за | едой—по |
| чайной, | десертной, | столовой | ложке |

| Название лекарства | От 6 мес. до 1 года |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Oleum Ricini | 1 чайная, |
| Pepsinum rossicum | 0,02—0,05 |
| Pulvis Doveri | От 2 до Не назна- чать! |
| “ Liquiritiae composit | От $\frac{1}{4}$ до |
| Phosphorum purum | 0,01 в 10,0 чи столько кап |
| Solutio arsenicalis Fowleri | — |
| Strychninum nitricum | Избегать. |
| Salolum purum | — |
| Senegae radix | Decoctum ex |
| Sirupus ferril iodati | — |
| “ rhamni catartici | — |
| Santoninum | — |
| Tinctura Strophanthi | — |
| “ Valerianae aetherea | 1 капля От 2 до |

| 1—2 лет. | 4—6 лет. | 8—10 лет. | 12 лет. |
|---|---|--|--|
| десертная, 0,1 4 раза 0,01—0,02 Не более 1 чайной, | столовая 0,12 в сутки 0,04—0,06 2 раза десертной | ложка на 0,15 от 2 до 4 0,1—0,15 на сут ложки на | прием 0,2 раз в сутки 0,2 ки прием |
| стого прован ель, сколько От $\frac{1}{4}$ капли до 1 капли Водн. 0,1% ра 1—2 делен. 0,05—0,1 0,1—0,2 1,0—2,0 чайной | ского " или ребенку мес От $\frac{1}{2}$ капли до 2 капель створ подко 3—4 делен. 0,12—0,15 0,24—0,3 3,0—4,0 — | миндального яц., регос, 2 От 1 капли до 3 жно, при сл 5 дел. до 1 см ³ 0,2 0,4 5,0 про десертной | масла раза в день 5 кап. × 2 аб. сердца 0,3 0,6 100,0 по л. 2—6 раз в сутки 25 капель в сутки прием |
| 5—10 кап.— 2 раза $\frac{1}{2}$ чайной | 15 капель в сутки до десертн | 20 капель 2 раза ой ложки на | |
| 0,01— 2 раза 1 капля 2 раза 3 капли 4 раз в | 0,025 в сутки 2—3 капли в день 4—6 капель сутки | 0,03 2 раза 3—4 ка 2 раза 8—10 От 2 до 4 | 0,05 в день пли— в день капель раз в сутки |

| Название лекарства | От 6 мес. до 1 года |
|---------------------------------|------------------------|
| Tinctura Opii simplex | Не назна- чать |
| " Chiniae composita | 3—5 камель |
| " nucis vomicis | 2—4 раза |
| " ferrti pomati | — |
| Thiocolum | — |
| Terpinum hydratum | — |
| Urethanum | — |
| Urotropium | — |

| 1—2 лет. | 4—6 лет. | 8—10 лет. | 12 лет. |
|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| 1—2 капли на сутки | 3 капли на сутки | 4—5 капель | 4—5 капель |
| 10 капель в сутки | 15 капель | 20—25 | капель |
| 1 каплю 2 раза | 2—4 2—3 капли в сутки | раза в сут | ки |
| 2—3 капли 2 раза | 4—5 капель в сутки | 4—5 капель | 4—5 капель |
| 0,05—0,1 2 раза | 0,15—0,2 в сутки | 2 раза | в сутки |
| 0,03—0,05 2 раза | 0,1—0,12 в сутки | 0,15—0,2 | 0,25 |
| 0,05 0,15 | 0,1—0,15 0,3—0,4 | 2 раза | в сутки |
| 0,05—0,1 2—4 раза | 0,12—0,15 в сутки | 0,2—0,25 | 0,3—0,4 1,0—1,25 —0,3 |

НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

I. СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ (NERVINA).

1. Средства успокаивающие (Sedativa), снотворные (Hypnotica), противосудо- рожные (Antispasmodica), болеутоляю- щие (Antalgetica).

1. Kalii bromati 6,0—10,0
(s. natrii bromati)
Aq. destillat. 180,0
M. D. S. По 1 стол. ложке 3 раза в день
на молоке (после еды).
2. Sol. Natrii bromati 6,0—8,0: 180,0
D. S. По 1 стол. ложке 3—4 раза в день
на молоке.
3. Kalii bromati
Natrii bromati 5,0
Ammonii bromati 3,0
Aq. destillat. 200,0
M. D. S. По 1 стол. ложке 3—5 раз в день;
запивать молоком.
4. Infus herbae Adonis vernalis ex 6,0—200,0
Natrii bromati 6,0
Codeini phosphorici 0,2
M. D. S. По 1 стол. ложке 3—4 раза в день.
(Бехтеревская микстура).
5. Bromipini 100,0
Ol. menthae pip. gtt. V.
M. D. S. 3-4 стол. ложки в день,

6. Bromurali 0,3—0,5
D. t. d. № 10.
S. По 1 порошку 2-3 раза в день.
7. Camphorae monobromatae 0,3
D. t. d. ad capsul. amylac. № 10.
S. Принимать 3-4 раза в день.
8. Adalini 0,5
D. t. d. (in tabulettis) № 10.
S. 1-2 порошка (таблетки)
перед сном; запить теплой водой.
9. Amyleni hydrati 10,0
Succi Liquirit. 5,0
Aq. destillatae ad 100,0
M. D. S. 2 столов. ложки перед сном;
запить водой.
10. Amyleni hydrati 3,0
Mucil. gummi arabici 10,0
Aq. destillatae ad 50,0
M. D. S. На одну клизму.
11. Paraldehydi 4,0
Siripi Rubi Idaeи 20,0
Aq. destillatae 130,0
M. D. S. Принять половину перед сном.
12. Paraldehydi 3,0
(s. Chlorali hydrati 1,0)
Mucil. Gummi arabici
Aq. destillatae ~~aa~~ 25,0
M. D. S. На одну клизму.
13. Chlorali hydrati 3,0
Mucil. Gummi arabici
Aq. destillatae ~~aa~~ 25,0
M. D. S. По 1 стол. ложке перед сном.
14. Chlorali hydrati 1,0
D. t. d. № 3.
S. Принять 1 порошок в молоке на ночь.

15. Veronali 0,3—0,5
D. t. d. (in tabulett.) № 6.
S. По 1 табл. перед сном; запить $\frac{1}{2}$ стак. щелочной воды.
16. Luminall 0,1—0,25
D. t. d. (in tabul.) № 6.
S. То же.
17. Sulfonali 0,5—1,0
D. t. d. № 6. S. За 1-2 часа перед сном принять 1 порошок; запить стаканом теплой воды (чая).
18. Trionali 0,5—1,0
D. t. d. № 6. S. За $\frac{1}{2}$ часа перед сном 1 порошок, запить стаканом теплой воды.
19. Infusi rad. Valerian. ex 8,0—200,0
Natrh bromatii 6,0—80
M. D. S. По 1 стол. ложке 2—3 раза в день.
20. Tinct. Valerianaе simpl. 30,0
D. S. По 30—40 капель несколько раз в день.
21. Tinct. rad. Valerianaе aether. 25,0
D. S. По 10—20 кап. несколько раз в день.
22. Tinct. Cannabis indic. 20,0
D. S. По 10—20 кап. несколько раз в день.
23. Morphii muriatici 0,01
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 6.
S. По 1 пор. 2—3 раза в день.
24. Solutionis Morphii muriatici 1% 10,0
D. S. Steril.
Для подкожных инъекций по 1 см².

25. Morphii muriatici 0,01
Butyri Cacao 1,5
M. f. suppositor. D. t. d. № 6.
S. По 1 свечке 2—3 раза в день.

2. Средства, возбуждающие нервную систему (Excitantia, Analeptica, Stimulantia).

26. Olei camphorat. sterlisati 20% 10,0
D. S. Pro injectionibus hypodermicus.
27. Camphorae 1,0
Ol. amygdal. dulc. 9,0
M. D. S. Sterilis. То же.
28. Sol. Cordiamini (Coramini) 25% 10,0
D. S. Sterilis. По 1—2 см³ подкожно,
внутримышечно или внутривенно.
29. Sol. Cordiamini (Coramini) 25% 10,0
D. S. По 30—50 кап. на прием.
30. Sol. Corazoli (Cardiazoli) 10% 10,0
D. S. Sterilis.
По 1 см³ подкожно.
31. Sol. Coffeini natrio-benzolci 10% 10,0
Steril.
D. S. То же.
32. Coffeini natrio-salicyl.
(s. natrio-benzoici) 0,1
Sacchari aibi 0,3
M. f. puiv. D. t. d. № 10.
S. По 1 порошку несколько раз в день.
33. Coffeini natrio-benzolci 0,25
D. t. d. № 6 in tabulett.
S. По 1 табл. несколько раз в день.

34. Coffeini puri 0,05—0,1
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. *D. t. d.* № 6.
S. По 1 пор. несколько раз в день.
35. Tinct. пис. vomic. 10,0
D. S. По 5—10 кап. 2—3 раза в день.
36. Strychnini nitrici 0,001
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. *D. t.d.* № 10.
S. По 1 пор. 1-2 раза в день.
37. Strychnini nitrici 0,02
Aq. destillatae 10,0
M. D. S. Steril. По $\frac{1}{2}$ -1 см³ подкожно
(операцион. шок., коллапс; парезы и
параличи).
38. Sol. Ephedrini hydrochlorici 5% 10,0
D. S. По $\frac{1}{2}$ -1 см³ под кожу
(при угнетении дыхательн. центра).
39. Ephedrini hydrochlorici 0,025—0,05
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. *D. t. d.* № 6.
S. По 1 порошку 2—3 раза в день.

II. Сердечно-сосудистые средства (*Cardiaca et Vasotonica*).

40. Fol. Digitalis pulv. 0,05—0,1
D. t. d. № 20 in obliatt.
S. По 1 облатке через каждые 2 часа.
41. Fol. Digital. pulv. 0,1
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. *D. t. d.* № 20
S. По 1 пор. 5—6 раз в день.

42. Infusi fol. Digitalis ex 1,0 ad 150,0
D. S. По 1 стол. ложке через каждые 2 часа.
43. Inf. fol. Digitalis ex 1,0 ad 150,0
Coffein. natr.-salicyl. 2,0
Tinct. Strophanthi 4,0
Liq. kalii acetici 30,0
M. D. S. По 1 стол. ложке через
каждые 2 часа.
44. Tinct. Digitalis 20,0
D. S. По 20—25 кап. 5—6 раз в день.
45. Tinct. Digitalis 1,0
Tinct. Strophanthi 5,0
Tinct. Valerian. aeth. 15,0
M. D. S. По 15—20 кап. несколько раз
в день.
46. Diginormi 15,0
D. S. По 15—20 кап. несколько раз в день.
47. Gitaleni 25,0
D. S. По 25—30 кап. 3—4 раза в день.
48. Gitaleni in ampull. 1,0
D. t. d. № 6
S. Подкожно или внутримышечно.
49. Gitaleni gtt. XXX
Tinct. Strophanthi gtt. VIII
Aq. destillatae 15,0
M. D. S. Per rectum (микроклизма).
50. Digalenti-Neo 1,0
D. t. d. № 6 in ampullis.
d. Подкожно, соотв. внутривенно 1—2 раза
в день.
51. Infusi herbae Adonis vernalis ex 5,0 : 150,0
D. S. По 1 стол. ложке через каждые 2
часа.

52. Infus. herb. Adonis vernalis ex 6,0 ad 150,0
Liq. kalii acetici 30,0
M. D. S. По 1 столов. ложке через каждые
2 часа.
53. Inf. herb. Adonis vernalis ex 6,0—8,0 : 200,0
Tinct. Strophanthi 4,0
(s. Tinct. Convallar. majalis 6,0
Tinct. Strychni 3,0);
M. D. S. По 1 стол. ложке через каждые
2—3 часа.
54. Adonileni (Extr. fluidi Adonis vernal.) 15,0
D. S. По 15—30 кап. несколько раз в день
(12 капель=1 стол. ложке инфузия гори-
цвета из 4,0 : 200,0; 15 капель=1 стол.
ложке ин. из 5,0 : 200,0; 18 капель=1 стол.
ложке ин. из 6,0 : 200,0; 20 капель=1 стол.
ложке ин. из 7,0 : 200,0).
55. Strophanthini 0,01
Aq. destillatae 100,0
M. D. S. По 1 чайн. ложке 2—3 раза
в день.
56. Tinct. Strophanthi 10,0
D. S. По 5 капель 4—5 раз в день
(5 кап. приблизительно=0,1 fol.
Digitalis).
57. Tinct. Strophanthi
Tinct. Strychni 5,0
M. D. S. По 10 кап. 3—4 раза в день.
58. Tinct. Strophanthi 5,0
Tinct. Valerian. aether. 15,0
M. D. S. По 15—20 кап. 3—4 раза в день.
59. Tinct. Convallar. majalis 20,0
D. S. По 15—25 кап. 4—6 раз в день.

60. Tinct. Convallar. majalis
Tinct. Valerian. simpl. ad 15,0
M. D. S. По 20—30 капель несколько раз в день.
61. Convaleci 1,0
D. t. d. № 10 in ampullis
S. По 1 см³ 1—2 раза в день подкожно (болезненно!).
62. Convaleci 0,5—1,0
Sol. Glucosae 20—40% ad 40,0
M. D. S. Sterilis. По 20 см³ внутривенно (медленно!) 1—2 раза в день.
63. Chinidini sulfurici 0,2
D. t. d. № 12.
S. По 1 пор. 2—3 раза в день (мерцат. аритмия).
64. Solut. Adrenalini hydrochlorici 1:1000 1,0
Solut. natrii chlorati physiolog. 15,0
M. D. S. Steril.
Для внутрисердечного впрыскивания.
См. эфедрин—рец. 38 и 39.
65. Strophanthini 0,0005
Sol. natrii chlorati physiolog. 15,0
M. D. S. Steril.
То же.
См. также рец. 28—30.
66. Natrii nitrosi 0,6
Kalii nitrici 24,0
Kalii carbonici 36,0
Aq. destill. ad 300,0
M. D. S. 1 стол. ложку на стакан воды принять в течение $\frac{3}{4}$ часа утром натощак.

67. Natrii nitrosi 2,0
 Kalii nitriti 10,0
 Natrii bicarbon. 20,0
 Aq. destill. ad 300,0
 M. D. S. Столовыми ложками.
 68. Amylli nitrosi 10,0
 D. S. 3—4 капли на носовой платок—
 вдыхать.
 69. Amylli nitrosi
 Spirit. vini aa 5,0
 M. D. S. 5—6 капель на платок—вдыхать.
 70. Solut. nitroglycerini alcoh. 1% 10,0
 D. S. По 1—2 капли несколько раз в день.
 71. Tabulett. Nitroglycerini 0,0005
 D. t. d. № 20
 S. По 1 табл. несколько раз в день.
 72. Salsolini hydrochlorici 0,01—0,03
 Sacchari albi 0,3
 M. f. pulv. D. t. d. № 12
 S. По 1 пор. 3 раза в день
 (при гипертонии).
 73. Sol. Salsolini hydrochlorici 1% 10,0
 D. S. Sterilis. Ежедневно по 1 см³ под кожу
 (20—25 инъекций на курс).
 74. Diaretini 0,5
 D. t. d. № 10
 S. По 1 порошку несколько раз в день
 (Angina pectoris).
 75. Papaverini hydrochlorici 0,03—0,05
 Sacchari albi 0,3
 M. f. pulv. D. t. d. № 6
 S. По 1 пор. несколько раз в день (артер.
 гипертония, склероз).

76. Solut. Natrii silicici 1% 10,0
 D. S. Steril. По 1—2 см³ внутривенно
 1—2 раза в неделю (10—12 инъекций
 на курс при артериосклерозе, гипертонии).
77. Natrii sulfurici 0,44
 Natrii chlorati 4,92
 Natrii phosphorici 0,15
 Natrii carbonici 0,21
 Kali sulfurici 0,4
 Aq. destillat. ad. 100,0
 M. D. S. Steril. По 1—5 см³ ежедневно или
 через день подкожно или внутримышечно
 (сыворотка Трунечека).
78. Natrii chlorati 4,92
 Natrii sulfurici 0,44
 Kali chlorati 0,35
 Natrii bicarbonici 0,42
 Natrii phosphorici 0,45
 Aq. destillatae 100,0
 M. D. S. То же (виоизменение Майкова
 и Шилова).
79. Sol. Sacchari amylac. 12,5—25% 40,0
 D. S. Steril.
 Внутривенно по 10—20 см³.
80. Diuretini 0,25—0,5
 Luminall (s. Antipyrini, s. Phenacetini) 0,03—0,1
 M. t. pulv. D. t. d. № 6
 S. По 1 пор. 3—4 раза в день (гипертония).
81. Coff-Ini puri 0,05
 Antipyrini
 Ph. acetini aa 0,25
 M. f. pulv. D. t. d. № 6
 S. По 1 пор. несколько раз в день (мигрень).

82. Calcium Diuretini 0,5
D. t. d. № 20
S. По 1 пор. 3—4 раза в день
(артериосклероз).
83. Calcium-Diuretini 0,5
Kalij jodati 0,1
M. f. pulv. D. t. d. № 20
S. По 1 пор. 3 раза в день.

III. КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА (HAEMOSTATICA).

I. При кровотечениях местных (наружных):

84. Solut. Adrenalini hydrochlorici 1:1000 10,0
Solut. Natrii chlorati physiolog. 100,0
M. D. S. Смачивать тампоны и вкладывать в нос.
85. Solut. Adrenalini hydrochlorici 1:1000 15,0
D. S. Для ватных тампонов в нос.
86. Alumin. crudi pulv. 20,0
Aq. destillat. 50,0
M. D. S. Втягивать в нос.
87. Solut. Ferropurgini 20% 50,0
D. S. Смачивать ватные тампоны.
88. Gelatinae alb. 5,0—10,0
Solut. Natrii chlorati physiolog. 100,0
M. D. S. Для орошения полости носа;
смачивания компресса.
89. Solut. Stypticini 20% 50,0
D. S. Для смачивания ватных тампонов.

90. Solut. Natrii chlorati 10% steril. 100,0.
D. S. Смоченные марлевые салфетки прикладывать к кровоточащему месту.
91. Solut. Sacchari amylac. (Glucosum) 20—25% 100.
D. S. Так же.
92. Serum antidiphthericum 50,0
D. S. Так же.

2. При маточных кровотечениях (Uterina).

93. Pulv. Secalis cornuti 0,25—1,0
D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3—4 раза в день.
94. Infusi Secalis cornuti ex 5,0—8,0 : 100,0
Acid. sulfurici dil. 4,0
Siripi simplic. ad 180,0
M. D. S. По 1 стол. ложке через каждые 2 часа.
95. Extr. Secal. corn. fl. 25,0
D. S. По 20—30 кап. несколько раз в день.
96. Extr. Secal. cornuti fl.
, Hydrastis canad. fl. aa 10,0
M. D. S. По 20—25 кап. на прием.
97. Extr. Secal. cornuti 3,0
Pulv. et Succi Liquirit. q. s. ut f. pilul. № 30
D. S. По 1—2 пилюли несколько раз в день.
98. Extr. fl. Hydrast. canad. 20,0
D. S. По 20—25 капель 3—5 раз в день.

99. Solut. extr. Secal. corn. 10% 10,0
D. S. Steril.
Подкожно по 1 см³.
100. Ergotini Bonjeani 10% in ampul. 10,0
D. S. Для подкожных инъекций.
101. Secaleni 15,0
D. S. По 15—20 капель на прием.
102. Secaleni in ampul. № 10.
D. S. Для подкожных инъекций по 1 см³.
103. Stypticini 0,05
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 порошку 4—5 раз в день.
104. Stypticini 0,5
Aq. destillat. 10,0
M. D. S. Steril.
Подкожно по 1 см³.
105. Extr. fl. Polygoni hydropiper. 25,0
D. S. По 30—40 капель на прием.
106. Polygonormii 15,0
D. S. По 25—35 кап. на прием (смесь
экстрактов разных видов водяного
перца).
107. Extr. Viburni fluid. 20,0
D. S. По 30—40 капель 3—4 раза
в день..
108. Extr. Bursae pastoris fl. 30,0
D. S. По 30—50 кап. на прием.

3. При желудочных и кишечных кровотечениях, кровавой рвоте (Haematemesis), гематурии, гемофилии.

109. Gelatinæ albae 40,0
Aq. destillatae 400,0
Sirupi Rubi Idaei 40,0
Acidi citrici 2.5
M. D. S. По 1—2 стол. ложке через каждые 2 часа (предварительно нагреть ложку в кипятке).
110. Natrii chlorati depurati 50,0
D. S. По небольшой чайной ложке с небольшим количеством воды несколько раз.
111. Calcii chlorati 4,0—6,0
Aq. destillatae 90,0
Sir. Menthae pip. 30,0
M. D. S. Через каждые 2 часа по столовой ложке.
112. Calcii chlorati 6,0
Aq. destillatae 10,0
Mucilag. Gummi arabici 10% 40,0
Emuls. oleosae ad 150,0
M. D. S. По 1 стол. ложке через 2 часа.
113. Gelatin. alb. 2,0—5,0
Sol. Natrii chlorati physiolog. 100,0
M. D. S. Steril.
Ввести 50—100 см³ подкожно.
114. Solut. Calcii chlorati sterilis. 5—10% 10,0
D. S. Внутривенно (остерегаться попасть в подкожную клетчатку!).

115. Solut. Natrii chlorati sterilis. 10% 10,0
D. S. Внутривенно.
116. Solut. Sacchari amyac. sterilis. 20—25% 10,0
D. S. Внутривенно.
117. Stypticini 0,05
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 4—5 раз в день.
118. Extr. fl. Polygoni hydropip. 20,0
D. S. По 30—40 кап. 3 раза в день.
119. Serum equinum sterile normale 30,0—40,0
D. S. Ввести подкожно или внутримышечно.

4. Кишечные кровотечения; помимо указанных при 3:

120. Opii pulverati 0,02—0,03
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 порошку через каждые
3 часа.
121. Tinct. Opii simpl. 20,0
D. S. По 8—15 капель 3—4 раза
в день.
122. Bismuthi subnitrici 1,0
Opii pulverati 0,02
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 порошку через каждые
3 часа.

5. При кровохаркании, кроме указанных при 3:

123. Codeini puri. 0,01
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. через каждые 3 часа.
124. Morphii muriatici 0,005
Plumbi acetici 0,02
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. через каждые 2 часа.
125. Morphii muriatici 0,01
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 6
S. По 1 пор. 3—4 раза в день.
126. Morphii muriatici 0,1
Atropini sulfurici 0,005
Aq. destillatae 10,0
M. D. S. Steril.
По $\frac{1}{2}$ —1 см³ подкожно.

IV. СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОБМЕН ВОДЫ (DIURETICA).

127. Liquor. Kalii acetici 50,0
D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в день.
128. Kalii acetici 5,0—10,0
Aq. destillat. 120,0
M. D. S. Через 2 часа по столовой ложке.
129. Liq. Kalii acetici 30,0
Aq. destillatae 200,0
M. D. S. По 1 столовой ложке через
каждые 2—3 часа.

130. Coffeini natrio-benzoici (s. natrio-salicyl.) 0,3
Sacchari albi 0,2
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3—4 раза в день.
131. Diuretini 0,5
D. t. d. № 15
S. По 1 пор. 5—6 раз в день
(не натощак).
132. Diuretini 6,0
Aq. destillat. 80,0
Aq. menthae pip. 100,0
Sirup. simpl. 10,0
M. D. S. По 1 стол. ложке через каждые
2 часа.
133. Ureae puriss. 20,0—30,0
Sir. Rubi Idaei 20,0
Aq. destillatae ad 200,0
M. D. S. Через 2 часа по столовой ложке
(если нет азотемии).
134. Calomelanos 0,25
Talci pulv. 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3 раза в день.
135. Calomelanos 0,25
Pulv. fol. Digitalis 0,1
M. f. pulv. D. t. d. № 10
in capsul. amylac.
S. По 1 облатке 3 раза в день.
136. Mercusali 1,0
D. t. d. № 6 in ampullis.
S. По 1—2 см³ внутримышечно
(внутривенно).

137. Infus. foli. Digitalis ex 1,0—1,5 : 150,0
Liquoris Kalii acetici
Sirupi simplici. \overline{a} 25,0
 M. D. S. По 1 стол. ложке через каждые
 2 часа.
138. Pulv. fol. Digitalis 0,1
Diuretini 0,5—1,0
 M. f. pulv. D. t. d. № 10
 S. По 1 пор. 3—4 раза в день за едой.
139. Tinct. Convallar. majalis 25,0
 D. S. По 15—20 кап, 3—4 раза в день.

V. СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПОТООТДЕЛЕНИЕ (DIAPHORETICA).

140. Flor. Chamomillae vulgar. 50,0
 D. S. 1 столовую ложку на 1—2 стакана
 горячей воды; пить как чай.
141. Flor. Sambuci 50,0
 D. S. 1—2 чайной ложки на 2 чашки го-
 рячей воды, пить как чай.
142. Flor. Tiliae 50,0
 D. S. 1 столовую ложку на 2—3 чашки
 горячей воды; пить как чай.
143. Infus. fol. Salviae ex 15,0 : 200,0
 D. S. Вечером выпить 1 горячую чашку.
144. Aspirini 0,5
 D. t. d. № 6
 S. По 1 пор. через каждые $\frac{1}{2}$ часа
 до появления пота.

145. Acidi camphorici cryst. 1,0—2,0
D. t. d. № 5 in oblat.
S. Принимать по 1 облатке на ночь
(против потов у туберкулезных).
146. Agaricini 0,01—0,03
Pulv. Doveri 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 5.
S. По 1 пор. на ночь (то же; есть привыкание).
147. Agatincini 0,01—0,03
Opili puri 0,02
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 5.
S. По 1 пор. на ночь (то же).
148. Atropini sulfurici 0,025
Succi et pulv. Liquirit.
q. s. ut f. pilul. № 50.
D. S. По 1 пил. на ночь (быстрое при-
выкание, нередки побочные явления).
149. Atropini sulfurici 0,02
Aq. destillatae 10,0
M. D. S. Принимать на ночь по 5—8 капель.
150. Eumydrini 0,02
Aq. destillat. 10,0
M. D. S. По 10 капель на ночь (есть
привыкание).
151. Formalini 30,0
D. S. 1 стол. ложку на стакан воды —
обтираять ноги (при ножном поте).
152. Acidi salicylici 1,0—2,0
Talci puri
Amyli aa 50,0
M. f. pulv.
D. S. Присыпка для ног после предвари-
тельного мытья их (то же).

VI. СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ДЫХАТЬ. АППАРАТ (RESPIRATORIA).

1. Средства против одышки (Antidis- pnoëtica), астмы (Antiasthmatica) и кашля (Antibechica).

153. Codeini puri 0,015
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 порошку 3-4 раза в день.
154. Codeini phosphorici 0,02—0,04
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3—4 раза в день.
155. Dionini 0,01
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3 раза в день
156. Morphil muriatici 0,1
Aq. destillatae 10,0
M. D. S. По 8—10 кап. 2—3 раза в день.
157. Morphii muriatici 0,01
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3 раза в день.
158. Solut. Oxycamphorae spirit. 50% (Oxaphor) 25,0
D. S. По 40—50 кап. несколько раз в день
до еды в столовой ложке воды.
159. Solut. Atropini sulfurici steril. 0,01:10,0
D. S. По $1/4$ — $1/2$ см³ подкожно 2—3 раза
в день (бронх. астма).

160. Extr. Belladonnae 0,01
Sacchari lactici 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 6
S. По 1 пор. 2—3 раза в день.
161. Scopolamini hydrobromici 0,01
Aq. destillatae 10,0
M. D. S. По 10 кап. 2—3 раза в день.
162. Coffeini natrio-salicylici 0,2
Antipyrini 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 3.
S. 1—2 пор. в начале припадка бронх. астмы.
163. Chlorali hydrati 2,0
Sirup. simplicis 20,0
Aq. destillat. ad 100,0
M. D. S. Принять в 2 приема в течение часа во время приступа.
164. Kalii iodati
Chlorali hydrati aa 1,0—3,0
Aq. destillatae 30,0
Sirupi simplic. 15,0
M. D. S. По 1 чайной ложке 3 раза через каждые $\frac{1}{2}$ часа (детям 5—15 лет).
165. Solut. Adrenalini hyd ochlorici 1:1000 10,0
D. S. По $\frac{1}{2}$ см³ подкожно.
166. Atropini sulfurici 0,15
Natrii nitrosi 0,6
Glycerini puri 2,0
Aq. destillatae 13,0
M. D. S. Распылять в нос во время приступа.

167. Fol. Stramonii
Kalii nitrici aa 25,0
M. f. pulv. subtil.
D. S. Сжигать на фарфоровом блюдце по 1 чайной ложке и вдыхать пары (во время припадка).
168. Fol. Belladonnae pulv.
Fol. Stramonii pulv. aa 15,0
Kalii nitrici 6,0
M. D. S. Сжигать по 1 чайной ложке и вдыхать пары.
169. См. эфедрин—рец. 38 и 39.

2. Средства отхаркивающие (Expectorantia) и ограничивающие отделение слизи, обеззараживающие и противовоспалительные.

170. Pulv. Doveri 0,3—0,5
D. t. d. № 6
S. По 1 порошку 3 раза в день.
171. Infusi radicis Ipecacuanhae ex 0,5 : 150,0
Thiocoli 5,0
(Codeini phosphorici 0,2)
Sirup. Liquiritiae 30,0
M. D. S. Через 2 часа по стол. ложке.
172. Infus. rad. Ipecacuanhae ex 0,5 : 160,0
Morphii muriatici 0,06
(s. Codeini phosphor. 0,15)
Sirup. simplic. 20,0
M. D. S. По 1 стол. ложке через 3 часа.

173. Infusi rad. Ipresacuanhae ex 0,12:60,0
Ammonii chlorati 0,6—1,0
Sirup. simpl. 10,0
M. D. S. По 1 чайной ложке через 2 часа
(ребенку 3—6 лет).
174. Inf. herbae Thermopsisidis ex 1,0:180,0
D. S. По 1 стол. ложке через каждые
3—4 часа.
175. Inf. herbae. Thermopsisidis ex 1,0:180,0
Liq. ammon. anisat.
Natrii bicarbonici $\frac{aa}{aa}$ 4,0
M. D. S. По 1 стол. ложке 4—5 раз в день.
176. Ammonii chlorati 5,0
Succi Liquirit. 15,0
Aq. destillatae 20,0
M. D. S. Через 2 часа по стол. ложке
(Mixtura solvens).
177. Liquor. Ammonii anisat. 10,0
D. S. По 5—10 кап. 3 раза в день.
178. Elix. pectoralis 15,0
D. S. По 20 кап. и больше в воде несколь-
ко раз в день.
179. Decocti rad. Senegae ex 6,0—10,0:180,0
Liq. ammonii anisat. 4,0
M. D. S. По 1 стол. ложке через 2 часа
180. Decocti rad. Senegae ex 10,0:180,0
Ammonii chlorati 3,0
Succi Liquirit. 10,0
M. D. S. По 1 стол. ложке через каждые
2—3 часа.

181. Decocti rad. Senegae ex 6,0 : 180,0
Liq. ammonii anisat.
Natr. bicarbonici \ddot{a} 4,0
Codeini puri 0,12
M. D. S. По 1 стол. ложке 3—4 раза в день.
182. Dec. rad. Senegae ex 6,0 : 180,0
Thiocoli 5,0
(Codeini puri 0,12)
M. D. S. По 1 стол. ложке 3—4 раза в день.
183. Apomorphini hydrochlorici 0,05
Acidi muriatici dil. 0,5
Aq. destillatae 150,0
M. D. S. По 1 стол. ложке несколько раз
в день.
184. Acidi benzoici 0,3
Sacchari albi 0,2
M. f. pulv. D. t. d. № 10
ad chart. ceratam.
S. По 1 пор. через 2—3 часа.
185. Natrii benzoici 0,3—1,0
D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3—4 раза в день.
186. Decocti (s. Infusi) rad. Althaeae ex
5,0—15,0 : 150,0
Ammonii chlorati 4,0
Sir. Senegae 15,0
M. D. S. По 1 стол. ложке через 2—3 часа,
187. Stibii sulfurati aurant. 0,05
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3 раза в день.

188. Stibii sulfur. aurant.
Pulv. rad. Ipecacuanhae
Opii pulverati aa 0,05
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. несколько раз в день.
189. Tartar. stibiati 0,06
Ammonii chlorati 3,0
Aq. destillatae 140,0
Succi Liquirit. 10,0
M. D. S. По 1 стол. ложке через 2—3 часа.
190. Terpini hydrati 0,1—0,3
D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3—4 раза в день (как отхаркивающее).
191. Terpini hydrati 0,4—0,6
D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 4—5 раз в день (для уменьшения секреции и дезинфекции при гноистном бронхите, гангрене легких и пр.).
192. Terpini hydrati 0,2
Pulv. Doveri 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3 раза в день.
193. Kreosoti 10,0
D. S. По 3—5 капель 2 раза в день после еды в молоке.
194. Kreosoti 10,0
Tinct. Gentianae 20,0
M. D. S. По 5—10 кап. 3 раза в день в молоке после еды.

195. Kreosoti 5,0
Ol. Jecoris asell. 200,0
M. D. S. По 1 стол. ложке 2—3 в день
после еды.
196. Duotali (Guajacol. carbonicum) 0,5
Dionini (s. codeini puri) 0,01
M. f. pulv. D. t. d. № 20
S. По 1 пор. 3 раза в день.
197. Thiocoli 0,5
(Dionini s. codeini puri 0,01)
D. t. d. № 20
S. По 1 пор. 3—4 раза в день по еде.
198. Thiocoli 5,0
(Codeini phosphorici 0,5)
Aq. destillatae 125,0
Sir. Aurantii 25,0
M. D. S. По 1 чайной—стол. ложке 3—4
раза в день.
199. Thiocoli
Terpini hydrati
Natrii benzoici 0,2
(Dionini s. codeini puri 0.01)
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3 раза в день.
200. Olei Terebinthinae 30,0
D. S. Налить чайную ложку на горячую воду
и вдыхать пары.
201. Ol. Cupressi 10,0
Spiritus vini ad 50,0
M. D. S. 10—15 капель на горячую воду—
вдыхать; 3—4 раза в день.

202. Ol. Eucalypti 20,0
 D. S. То же по 10—30 капель.
- 203 Tinct. Eucalypti 15,0
 Ol. Lavandulae gtt. V.
 M. D. S. То же по 10 капель.

VII СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ (DIGESTIVA).

1. Желудочные средства (Stomachica).

204. Acidi muriatici dil. 10,0
 D. S. По 10—15 кап. в рюмке сахарной воды
 после еды (после приема полоскать рот).
205. Ac. muriatici dil. 3,0—5,0
 Aq. destillata ad 200,0
 M. D. S. Столовыми ложками.
206. Ac. muriatici dil. 4,0
 Pepsini 2,0—4,0
 Aq. destillatae ad 200,0
 M. D. S. По 1 стол. ложке 2—3 раза в день
 после еды.
207. Ac. muriatici dil. 2,0
 Pepsini 1,0—2,0
 Aq. destillatae 45,0
 Sir. simpl. 15,0
 M. D. S. По 1 чайн. ложке 3—4 раза в день
 после еды (детям).
208. Succi gastrici naturalis 200,0
 in. fl. orig.
 D. S. По 1 стол. ложке 3 раза в день перед
 едой.

209. *Tinct. Chiae compos.* 25,0
Ac. muriatci dil. 4,0
Pepsini 2,0
M. D. S. По 20—30 кап. после еды.
210. *Extr. Belladonnae* 0,01
Magnesiae ustae 0,3
M. f. pulv. *D. t. d.* № 10
S. По 1 порошку 2—3 раза в день.
211. *Natrli bicarbonici*
 • *Magnesiae ustae* \bar{a} 20,0
 (*Sacchari lactici* 15,0)
M. f. pulv.
D. S. По $\frac{1}{2}$ чайной ложке.
212. *Magnesiae ustae* 0,3
D. t. d. № 10
S. По 1 порошку повторно.
213. *Carbon. animal.* 0,5—1,0
D. t. d. № 10
S. По 1 порошку несколько раз в день
 (повышенная кислотность).
214. *Extr. Belladonnae* 0,5—0,75
Magnes. ustae
Bolus albae \bar{a} 25,0
Rhizom. Rhei ad 60,0
M. f. pulv. *D. S.* 2—3 раза в день
 на кончике ножа.
215. *Calcii carbonici* 10,0
Magnesiae ustae 20,0
M. f. pulv.
D. S. По $\frac{1}{2}$ чайной ложке.
216. *Orexini tannici* 0,5
D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 1—2 раза в день за едой.

217. Tinct. Strychni 15,0
 D. S. По 5 кап. за $\frac{1}{4}$ часа до еды.
 218. Tinct. amarae 20,0
 D. S. По 20—30 кап. за час до еды.
 219. Tinct. Chinae compos. 20,0
 D. S. По 20—30 кап. за час до еды.
 220. Tinct. Nucis vomic. 5,0
 Tinct. Gentian.
 Tinct. Chinae compos. $\bar{a}a$ 10,0
 M. D. S. По 15—20 кап. за час до еды
 2—3 раза в день.
 221. Tinct. Gentianae
 Tinct. amarae
 Tinct. Absinthi $\bar{a}a$ 15,0
 M. D. S. По 30—40 кап. 2—3 раза в день
 за час до еды.
 222. Tinct. amarae
 Tinct. Nuc. vomic. $\bar{a}a$ 15,0
 M. D. S. По 10—15 кап. за час до еды
 2—3 раза в день.
 223. Tinct. Nuc. vomic. 5,0
 Tinct. amarae
 Tinct. Gentianae $\bar{a}a$ 10,0
 M. D. S. По 10—25 кап. 3 раза в день
 за час до еды.

2. Рвотные и противорвотные средства; противосудорожные средства (Emetica et Antiemetica; Antispasmodica).

224. Apomorphini hydrochlorici 0,05—0,1
 Aq. destillatae 10,0
 M. D. S. Steril. По $1/2$ —1 см³ подкожно.

225. Apomorphini hydrochlorici 0,005—0,01
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 3
S. 1 порошок на прием (менее надежно).
226. Inf. rad. Ipecacuanhae ex 3,0:50,0
D. S. Через каждые 5—10 минут по 1 стол.
ложке взрослым, по 1 чайной детям—до
наступления рвоты (осторожно у слабых!).
227. Rad. Ipecacuanhae pulv. 0,3—1,0
D. t. d. № 4
S. По 1 пор. через $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ часа до рвоты
(то же).
228. Cupri sulfurici 1,0
Aq. destillatae 60,0
M. D. S. По 1 чайной ложке через каждые
10 минут до рвоты.
229. Aether. sulfur. 10,0
D. S. По 5—10 капель в $\frac{1}{2}$ рюмке воды.
230. Aq. chloroformii 60,0
D. S. По 1 чайн.—стол. ложке.
231. Liquor. anodyn. Hoffmanni 10,0
D. S. По 20—30 капель повторно.
232. Aëroni in tabullet. № 10
D. S. Против симптомов морской болезни
(не более 4 табл. в день).
233. Tinct. Jodi 10,0
D. S. По 3—5 кап. в воде.
234. Mentholi 0,05
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 порошку повторно.

235. *Mentholi* 0,1—0,3
Spiritus vini 50,0
M. D. S. По 20—30 капель через каждые
1—2 часа.
236. *Tinct. Menthae piper.* 10,0
D. S. По 5—15 кап. на воде повторно.
237. *Anaesthesini* 0,3—0,5
D. t. d. № 5
S. По 1 порошку 2—3 раза в день.
238. *Anaesthesini*
Rad. *Rhei pulv.*
Bismuthi subnitrici 0,2
M. f. pulv. D. t. d. № 6
S. По 1 порошку 2—3 раза в день.
239. *Extrac. Belladonnae* 0,015
Sacchari lactici 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3 раза в день.
240. *Atropini sulfurici* 0,01
Aq. *destillatae* 10,0
M. D. S. По 10—15 капель 2—3 раза в день.
241. *Extrac. Belladonnae* 0,015
Sacchari lactici 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 6
S. По 1 пор. 3 раза в день.
242. *Papaverini hydrochlorici* 0,03—0,05
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3 раза в день (при спазмах
гладкой мускулатуры пищеварит. и мо-
чеполового аппарата).

243. Papaverini hydrochlorici 0,5
 Aq. destillatae 10,0
 M. D. S. По 8—12 кап. на прием несколько раз в день.
244. Papaverini hydrochlorici 0,05—0,1
 Aq. destillatae 10,0
 M. D. S. По 10—20 кап. на прием 2—3 раза в день (детям).

3. Слабительные средства (Cathartica s. Purgantia).

245. Calomelanos 0,2—0,3
 Talci puri 0,3
 M. f. pulv. D. t. d. № 3
 S. По 1 порошку через час (в случае отсутствия стула—ol. ricini).
246. Natrii sulfurici 30,0
 D. S. 1 чайн.—стол. ложку на прием в стакане теплой воды натощак (не назначать лежащим в постели).
247. Natrii sulfurici sic. 22,0
 Kalii sulfurici 1,0
 Natrii chlorati 9,0
 Natrii bicarbonici 18,0
 M. f. pulv. D. S. Натощак 1 чайн.—столов. ложку в стакане теплой воды (искусственная Карлсбадская соль—Sal Carolinum factitium).
248. Magnesii sulfurici 30,0
 D. S. 1 чайн.—стол. ложку на прием в стакане воды.

249. *Magnes. sulfurici* 50,0
Natrii bicarbonici 10,0
M. f. pulv. D. S. 1 чайную ложку на стакан воды.
250. *Magnes. sulfurici*
Natrii sulfurici
Natrii bicarbonici aa 20,0
M. f. pulv. D. S.
По 1 чайной ложке на прием.
251. *Magnes. citrici* 30,0
D. S. По 1—2 чайн. ложки в $\frac{1}{2}$ стакане воды.
252. *Magnes. usgae* 5,0—8,0
D. S. Принять на ночь (легкое слабительное).
253. *Pulv. Liquirit. compositi*
(*pulv. Glycyrrhizae composit.*) 15,0
D. S. По 1 чайной ложке.
254. *Ol. Ricini* 20,0—30,0
D. S. На прием.
255. *Ol. Ricini* 15,0
Gummi arabici 7,5
f. cum Aq. destill.
emulsio ad 150,0
D. S. (*Emulsio Olei Ricini*).
256. *Emulsio Ol. Ricini* 200,0
Bisuthi subnitrici 5,0
Benzonaphtholi 1,5—2,0
M. D. S. Столовыми ложками (перед употреблением взбалтывать).
257. *Podophyllini* 0,01
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 20
S. По 1 пор. 1—2 раза в день.
(привычный запор),

258. *Podophyllini* 0,3
 Pulv. rad. *Rhei* 6,0
 Extr. *Rhamni frangulae*
 q. s. ut f. pilul. № 60
 D. S. По 1—3 пил. 1—2 раза в день (тоже).
259. *Podophyllini* 1,0
 Extr. *Aloës*
 Pulv. rad. *Rhei* 4,0
 Succi *Liquirit.* q. s.
 ut f. pilul. № 30
 D. S. По 1-2 пилюли.
260. *Infusi fol. Sennae frigide*
 paratum ex 5,0 : 50,0 — 100,0
 D. S. Принять половину.
261. *Inf. Sennae composit.* 50,0
 D. S. По 1—2 стол. ложки на прием.
262. *Inf. Sennae salini* 100,0
 D. S. Чайными — столовыми ложками.
263. *Decociti cort. Frangulae* ex 20,0 ad 100,0
 Sirup. simpl. 50,0
 M. D. S. По 1—2 стол. ложки на прием.
264. *Franguleni* (extr. *Frangulae fluid.*) 50,0
 D. S. По 2 чайных ложки на ночь.
265. Extr. *Cascar. sagrad.* fl. 50,0
 D. S. По 30—50 кап. 1—2 раза в день.
266. Extr. *Aloës* 0,3—0,5
 D. t. d. № 6 in capsul. amy lac.
 S. По 1—2 облатки в день.
267. Extr. *Alöes*
 Sapon. medic. 1,0
 Pulv. rad. *Rhei* 0,5
 M. ut f. pilul. № 20
 D. S. По 2 и больше пилюль на ночь.

268. Extr. Aloës

Extr. Rhei simpl. aa 2,0

Sapon. medic. 1,0

Succi Liquirit. q. s. ut f. pilul. № 30.

D. S. По 3 пил. на ночь.

269. Extr. Aloës 3,0

Extr. Belladonnae 0,5

Sapon. medic. q. s. ut f. pilul. № 30

D. S. По 1—2 пилюли.

270. Aloës

Extr. Rhei compos. $\overline{\text{aa}}$ 3,0

Extr. Strychni 0,3

Pulv. et succi Liquirit. q. s. ut f. pilul. № 30

D. S. По 1 пил. утром и вечером.

271. Pulv. rad. Rhei 0,5—1,0.

D. t. d. № 10

S. По 1 порошку.

272. Pulv. rad. Rhei

Magnesiae ustae $\overline{\text{aa}}$ 1,0

M. f. pulv. D. t. d. № 10

S. По 1 порошку.

273. Pulv. rad. Rhei 20,0

Flor. sulfuris

Natrii bicarbon. $\overline{\text{aa}}$ 10,0

M. f. pulv. D. S. На ночь 1 чайную ложку.

274. Pulv. rad. Rhei 20,0

Natrii sulfurici 10,0

Natrii bicarbonici 5,0

M. f. pulv. D. S. Принять в воде 1 чайную ложку.

275. Inf. rad. Rhei ex 10,0 ad 100,0

Sirupi Rhei 50,0

M. D. S. 1 стол. ложку на ночь.

276. Sulfur. depurati
Magnesiae ustae
Pulv. rad. Rhei
Etaeosacchari Foeniculi 15,0
M. D. S. Чайную ложку на ночь.

4. Противопоносные и вяжущие средства (Antidiarrhoica et Adstringentia).

277. Benzonaphtholi 0,3—0,5
D. t. d. № 6
S. По 1 порошку 3 раза в день.
278. Bismuthi subnitrici 0,5
D. t. d. № 10
S. По 1 порошку 3 раза в день.
279. Bismuthi salicyl. basici 0,5
D. t. d. № 10
S. По 1 порошку 3 раза в день.
280. Bismuthi subgallici (Dermatoli) 0,3—0,5
D. t. d. № 10.
По 1 порошку 3 раза в день.
281. Saloli 0,5
D. t. d. № 6
S. По 1 порошку несколько раз в день.
282. Tannalbini 0,3—0,5
D. t. d. № 6
S. По 1 порошку несколько раз в день.
283. Magnes. perhydroli 0,5
D. t. d. № 10 (in tabulett.)
S. По 1—2 табл. 3—4 раза в день до или
после еды.

284. *Bolus albae* 200,0
D. S. По 1 стол. ложке несколько раз в день перед едой, взболтав в воде.
285. *Carbonis animal. medicinal. pulver.* 200,0
D. S. По 1 стол. ложке, предварительно взболтав в воде, 2—3 раза в день.
286. *Carboleni* 50,0—100,0
D. S. По $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке 2—3 раза в день.
287. *Calcii carbonici*
" *phosphorici* $\overline{\text{aa}}$ 25,0
M. f. pulv. D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в день.
288. *Calcii carbonici*
" *phosphorici* $\overline{\text{aa}}$ 30,0
Bismuthi subgallici 10,0
M. f. pulv.
D. S. По $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке 2—3 раза в день.
289. *Aquaæ Calcariae* 100,0
D. S. По 1 стол. ложке на $\frac{1}{2}$ стакана теплого молока.
290. *Tinct. Opii simpl.* 10,0
D. S. По 8—10 капель 2—3 раза в день.
291. *Tinct. Opii simpl.*
" *Menthae piper.*
" *Valerian. aether.* $\overline{\text{aa}}$ 10,0
M. D. S. По 15—20 капель 3 раза в день.
292. *Opii puri* 0,01—0,025
(s. *Pantoponi*)
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 6
S. По 1 порошку 2—3 раза в день.

293. Tinct. Opii simpl.
 Belladonnae $\frac{aa}{a}$ 7,5
 M. D. S. По 10—15 капель несколько раз
 в день.
294. Extr. Opii aquos. 0,03
 Belladonnae 0,015
 Sacchari lactici 0,3
 M. f. pulv. D. t. d. № 10
 in chart. cerat.
 S. По 1 порошку 2—3 раза в день.
295. Pantoponi 0,3
 Aq. destillatae 15,0
 M. D. S. По 15—20 капель на прием.
296. Extr. Belladonnae 0,015—0,02
 Sacchari lactici 0,3
 M. f. pulv. D. t. d. № 6
 S. По 1 порошку 2—3 раза в день.
297. Bismuthi subnitrici
 Saloli $\frac{aa}{a}$ 0,25
 M. f. pulv. D. t. d. № 10
 S. По 1 порошку 3 раза в день.
298. Bismuthi subnitrici
 Magnesiae ustae $\frac{aa}{a}$ 0,25
 Extr. Belladonnae 0,015
 M. f. pulv. D. t. d. № 10
 S. По 1 порошку 3 раза в день.
299. Bismuthi subnitrici
 Saloli $\frac{aa}{a}$ 0,25
 Extr. Opii 0,015
 M. f. pulv. D. t. d. № 6
 S. По 1 порошку 3 раза в день.

300. *Bismuthi subnitrici*
Tannalbini аз 0,25—0,5
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 порошку 3 раза в день.
301. *Papaverini hydrochlorici* 0,03—0,05
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 6
S. По 1 порошку 3 раза в день.
302. *Papaver. hydrochlor.* 0,02
Extr. Belladonnae 0,01
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 6
S. По 1 порошку 2—3 раза в день.
303. *Gut. Botkini* 10,0
D. S. По 15—30 капель несколько раз в день.
304. *Gutt. Inosemzowi* 10,0
D. S. По 15—25 капель 3 раза в день.
305. *Gutt. Thielmanni* 10,0
D. S. По 20—30 капель несколько раз в день.

5. Желчегонные средства *(Choleretica et Cholagoga).*

306. *Fellis tauri depurati sicc.* 0,1—0,5
D. t. d. № 15 in caps. gel.
S. По 1 капсуле несколько раз в день.
307. *Natrii glycocholici* 0,2—0,3
D. t. d. № 15 in caps. amył.
S. По 1 облатке 3—4 раза в день.
308. *Natrii glycocholici* 3,0
Extr. et pulv. Liquirit. q. s. ut f. pilul. № 30
D. S. 4—6 пилюль на день.

309. Atophani 0,5
D. t. d. № 15
S. По 1 порошку 3—6 раз в день.
310. Natrii salicylici 0,5—1,0
D. t. d. № 15
S. По 1 порошку 3—4 раза в день
311. Aspirini 0,5
D. t. d. № 10
S. По 1 порошку 3 раза в день.
312. Natrii salicylici
" bicarbonici
" sulfurici aa 0,5
M. f. pulv. D. t. d. № 15
S. По 1 порошку 3 раза в день.
313. Sol. Natrii s. Magnes. sulfurici 15—20% 50,0
D. S. Ввести в 12-перстную кишку через
дуоденальный зонд.
314. Urotropini 0,5
D. t. d. № 10
S. По 1 порошку 3—5 раз в день.
315. Aspirini
Urotropini aa 2,0—3,0
Sirup. simpl. 20,0
Aq. destillatae ad 200,0
M. D. S. По 1 столовой ложке через каж-
дые 2 часа.
316. Olei olivar. provinc. 200,0
Spiritus vini Cognac. 20,0
Mentholi 0,5
Vitellorum ovi № II
M. D. S. По 1—2 столовых ложки несколько
раз в день натощак; запивать.

317. Aether. sulfurici 20,0
Olei Terebinthin. rectif. 5,0
M. D. S. 3 раза в день по 20—30 капель на молоке (смесь Диоранда).
318. Natrii oleinici (Eunatrol) 5,0
Glycerini
Bolus albae q. s. ut f. pilul. № 20.
D. S. По 2—3 пил. 2—3 раза в день после еды.
319. Glucosi (Sacchar. amyл.) 5,0—100,0
D. S. Принять в стакане воды или ввести в 12-перстную кишку через дуоденальный зонд.
320. Natrii oleinici 10,0—15,0
Tinct. Valerianae 10,0
Aq. Menthae ad 180,0
M. D. S. По 1 чайной ложке натощак 3 раза в день.
321. Calomelanos 0,05
Talci puri 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 порошку 3 раза в день.
322. Podophyllini
Extr. Belladonnae (s. Opii pulver.) aa 0,01
M. f. pulv. D. t. d. № 15
S. По 1 порошку 3 раза в день.
323. Atropini sulfurici 0,01
Aq. destillatae 10,0
M. D. S. По 10 капель 1—2 раза в день.
324. Scopolamini hydrobromici 0,0002—0,0005
Papaverini hydrochlorici 0,04—0,06
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 6.
S. По 1 пор. 3 раза в день (при спазмах желчного пузыря и желчных путей).

325. Morphii muriatici
 Extr. Belladonnae \overline{a} 0,01
 Sacchari lactici 0,3
 M. f. pulv. D. t. d. № 6
 S. По 1 пор. 2—3 раза в день.
326. Inf. rad. Rhei ex 10,0 ad 175,0
 Magnes. sulfurici 5,0
 Ol. Menthae pip. git. III
 Sir. simplic. ad 200,0
 M. D. S. По 1 стол. ложке 3—4 раза в день
 (при катаральной желтухе).

6. Глистогонные средства (Anthelmintica).

327. Extr. Filicis maris aether. 1,0
 D. t. d. № 6 in caps. gelat.
 S. Принять все в течение 1 часа.
328. Extr. Filicis maris aether.
 Pulv. rhizom. Filicis maris \overline{a} 3,0—5,0
 M. f. boli № 20
 D. S. Принять в два приема по 10 штук
 в течение $\frac{1}{2}$ часа.
329. Extr. Filicis maris aether. 1,0
 Mellis depurati q. s. ut f. electuar.
 D. S. Принять в течение часа в 2—3 приема.
330. Corticis Granati 50,0
 macera per horaz XII cum Aqua 300,0
 deinde coque usque ad colat.
 addere Sirup. cortic. Aurant. 30,0
 M. D. S. Натощак в течение часа в несколько приемов.

331. Extr. cort. Granati 10,0—25,0
D. S. Принять в 3—4 приема с промежутками
в час.
332. Pelletierini tannici 0,25—1,0
D. S. На прием; через $\frac{1}{2}$ часа слабительное
(можно ol. ricini).
333. Thymoli 1,0
D. t. d. № 4—6 in caps. gelat.
S. Принимать по 1 капс. через каждые $\frac{1}{2}$ —1
час. Спустя 2 часа—слабительное (можно
и ol. ricini).
334. Santonini 0,03—0,05
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3 раза в день после еды в тече-
ние 3 дней.
335. Tabulettae Santonini 0,02
D. t. d. № 10
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день.
336. Santonini 0,03
Calomelanos 0,02
Talci puri 0,5
M. f. pulv. D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3 раза в день.
337. Osarsoli 0,25
D. t. d. № 10 in tabulett.
S. По 1 таблетке 4 раза в день за час
до еды.

VIII. СРЕДСТВА ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ (ANTIPYRETICA), ПРОТИВОНЕВРАЛГИЧЕСКИЕ (ANTINEURALGICA) И ПРОТИВОРЕУМАТИЧЕСКИЕ (ANTIRHEUMATICA).

338. Antipyrini 0,3—0,5
D. t. d. № 6
S. По 1 пор. 2—3 раза в день.
339. Antipyrini 1,0
Aq. destill. 75,0
Mucil. Gummi arabici 25,0
M. D. S. На одну клизму.
340. Salipyrini 0,3—0,5
D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3—4 раза в день натощак.
341. Salipyrini 0,3—0,5
Coffeint natrio-salicylici 0,1
M. f. pulv. D. t. d. № 6
S. По 1 порошку 3 раза в день.
342. Pyramidoni 0,3
D. t. d. № 5
S. По 1 порошку 3 раза в день.
343. Pyramidoni 1,0
Aq. destill. 200,0
M. D. S. Через 2 часа по столовой ложке.
344. Pyramidoni 5,0
Succi Citri 30,0
Aq. destill. ad 180,0
M. D. S. По 1 стол. ложке 2—3 раза в день.
345. Pyramidoni 0,3
Coffeini natrio-salicyl. 0,1
M. f. pulv. D. t. d. № 6
S. По 1 порошку 2—3 раза в день.

346. **Pyramidoni** 1,0
 Coffeini natrio-salicylici 0,75
 Aq. destillatae 100,0
 Sir. Rubi Idaei 20,0
 M. D. S. 3—5 столовых ложек в день.
347. **Phenacetin** 0,3—0,5
 D. t. d. № 6
 S. По 1 порошку 2—3 раза в день.
348. **Phenacetini** 0,5
 Coffeini n. tr. salicylici 0,1
 M. f. pulv. D. t. d. № 6
 S. По 1 порошку 2 раза в день.
349. **Phenacetini**
 Aspirini (s. Pyramidoni) 0,25
 Codeini phosphor 0,03
 M. f. pulv. D. t. d. № 10
 S. По 1 пор. 2 раза в день (при невралгии).
350. **Aspirint**
 Phenacetini 0,25
 M. f. pulv. D. t. d. № 6
 S. 2—3 порошка в день.
351. **Aspirini** 0,5
 D. t. d. № 6
 S. По 1 порошку 3 раза в день.
352. **Aspirini** 0,5
 Coffeini pulv. 0,05
 (s. coff. natri.-salicylici 0,1)
 M. f. pulv. D. t. d. № 6
 S. По 1 порошку 2—3 раза в день.
353. **Aspirini**
 Urotropini 2,0
 Sir. simplic. 20,0
 Aq. des. ill ad 200,0
 M. D. S. Через 2—3 часа по столовой ложке.

354. Ac. salicylici 1,5
Natrii phosphor et 3,0
Aq. destillatae 180,0
Sir. Rubi Idaei ad 200,0
M. D. S. Столовыми ложками.
355. Natrii salicylici 0,5—1,0
D. t. d. № 15
S. По 1 пор. 5—6 раз в день, запивать содо-
вой водой (остр. суст. ревматизм).
356. Natrii salicylici 10,0
Aq. destillatae 180,0
Sirup. Liquirit. 15,0
M. D. S. по 1 столовой ложке через каждые
1—2 часа.
357. Natrii salicyl et 1,0
" bicar. op et 0,3—0,5
M. f. pulv. D. t. d. № 12
S. 5—6 порошков в день.
358. Saloli 0,5
D. t. d. № 6
S. По 1 порошку 3 раза в день.
359. Methylis salicylici
Chloroformii 5,0
Ol. Hyoscyami 15,0
M. D. S. Смазать больной сустав, покрыть
клеенкой и ватой; забинтовать.
360. Mesotan
Ol. Olivari 25,0
M. D. S. Смазывать кисточкой 2 раза в день
в количестве 1 чайной ложки (каждый раз
новое место).

361. Mesotani 10,0
 Vaseline 30,0
 M. D. S. Смазывать кисточкой 2—3 раза в день.
362. Mesotani 15,0
 Ichthyoli 5,0
 Chloroformii 10,0
 OI. Clivar. 20,0
 M. D. S. Смазывать 2—3 раза в день.
363. Chloroformii
 OI. Hyoscyami ~~aa~~ 20,0
 M. D. S. Для втирания.

IX. ПРОТИВОМАЛЯРИЙНЫЕ СРЕДСТВА.

364. Chinini muriatici s. sulfurici 0,25
 D. t. d. № 30 in caps. gel.
 S. Первые 10 дней через 2 часа 6 раз в день;
 пауза 2 дня; 2 дня хинин—пауза 3 дня и
 т. д. в течение 2 месяцев (Nocht).
365. Chinini muriatici s. sulfurici 0,3
 D. t. d. № 30 in caps. gelat.
 S. 3 приема в день, начиная со дня приступа,
 в течение 6 дней; 4 дня пауза, 3 дня хинин
 и т. д. (Nocht).
366. Chinini muriatici 0,2—0,3
 D. t. d. № 30 (in caps. gelat)
 S. 6 приемов в сутки (через каждые 4 часа)
 в течение 3 дней при трехдневн. и тропич.
 форме и 4 дней при четырехдневной; пауза
 5—6 дней; 3—4 дня хинин и т. д. (Мош-
 ковский).

367. Chinini muriatici 0,5—1,0
D. t. d. № 10
S. 3 приема в день через каждые 8 часов в течение 3 дней; пауза (при тропич.—6, при др. формах—9 дней); хинин—пауза и т. д. в течение 2—3 месяцев (Бруннер).
368. Chinini muriatici s. sulfurici 0,15
D. t. d. № 25
S. Принимать в течение 48 часов через каждые 2 часа; перерыв 6 дней—слабительные; с 9-го дня новый курс и т. д. (Odisner).
369. Chinini muriatici 4,0
Spiritus vini 50% ad 60,0
M. D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в сутки через каждые 8 часов.
370. Sol. Chinini bimuriatici 50% steril. 10,0
D. S. Для подкожных инъекций по 1 см³.
371. Chinini muriatici 3,0
Antipyrini 2,0
Solve in aq. tepida 6,0
D. S. Steril. Для подкожных инъекций по 1 см³.
372. Chinini muriatici 1,0
Sol. Natrii chlorati physiol. ad 100,0
M. D. S. Steril. По 50—100 см³ на внутривенное вливание (коматозная форма).
373. Chinini bimurialici 2,0
Decocti Salep. 50,0
Tinct. Opii simpl. gtt. V
M. D. S. Для одной клизмы после предварительного промывания.
374. Eudchinini 0,1—0,5
D. t. d. № 10
S. По 1 пор. 3—4 раза в день.

375. Plasmocidi 0,01—0,02
D. t. d. № 10 in tabuett.
S. По 1 табл. 3—4 раза в день курсами (не действует на кольца тропич. малярии; не может заменить хинина! хорошее профилактическое).
376. Plasmocidi 0,01
Chinini sulfur. 0,3
D. t. d. № 10 in caps. gelatin. (in tabullet.)
S. 3—4 приема в день курсами.
377. Acrichini 0,1
D. t. d. № 10 in tabuett.
S. 3 приема в день, курсами в 5 дней (аналог хинина!).
378. Sol. Acrichini bihydrochlorici 2% 50,0
D. Sterilis. Внутримышечно по 10 см³ раз в день.
379. Acrichini 0,1
Plasmocidi 0,02
M. f. pulv. D. t. d. № 15
S. По 1 порошку 3 раза.
380. Chinini muriatici 5,0
Acidi arsenicosi 0,1—0,2
Pulv. et succi Liquirit. q. s.
ut f. pilul. № 100.
D. S. По 1—2 пил. 3 раза в день после еды (хроническая малярия—Autrecht).
381. Chinini ferrocitrici 6,0
Acidi arsenicosi 0,1
Strychnini nitrici 0,06
Mass. pilular. q. s. ut f. pilul № 50
D. S. По 1 пил. 3 раза в день после еды.

382. Chinini sulfurici 3,0
 Ferrt hydrog. reducti 7,5
 Ac. arsenicosi 0,1
 Strychn. nitrict 0,6
 Mass. pilular. q. s. ut f. pilul. № 60
 D. S. По 1 пил. 3 раза в день после еды.
383. Heosalvarsani (Novoarsolani) 0,45—0,6
 D. t. d. № 4. S. Внутриенно с промежутками
 в 4—6 дней; параллельно — хинин, исключая
 дней вливания.
384. Osarsolt 0,25
 D. t. d. № 20
 S. 3—4 раза в день (до 20 приемов на курс).
385. Methyleni coerulei medicin. 0,1—0,3
 Pulv. *cinnis moschatae* 0,15
 M. f. pulv. D. t. d. № 12 in caps. amyiac.
 S. 2—3 облатки в день.
386. Sol. Methyleni coerule. medic. steril. 2% 10,0
 D. S. По 1—3 см³ ежедневно подкожно или
 внутримышечно (часто инфильтраты).
387. Chinini bimuriatici 7,5
 Methyleni coerule. 0,45
 Aq. destillatae 15,0
 M. D. S. Steril. По 1 см³ подкожно ежедневно
 в течение 12—15 дней (Кушев).
388. Sol. chinini muriat. spirit. 10%
 Tinct. Jodi 5% за 10,0
 M. D. S. По 25 кап. 2 раза в день (Рубашкин).
389. Jodi puri 0,2
 Saloli 2,0
 Ol. Olivar. 10,0
 M. D. S. Steril. Внутримышечно 1 раз в неделю
 по 5—10 см³ (David).

X. СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ (МЕТАБОЛИКА) И КРОВЕТВОРЕНИЕ (НАЕМАТОРООЕТИКА).

390. Liquoris arsenicalis Fowleri 10,0
D. S. 3 раза в день за едой; начать с одной капли на прием, постепенно увеличив дозу до 3—4 капель.
391. Ac. arsenicosi 0,02
Aq. destillatae 20,0
M. D. S. Начать с 5 капель на прием 3 раза в день за едой.
392. Liq. arsenicalis Fowleri 5,0
Tinct. Gentianae 15,0
M. D. S. 3 раза в день после еды по 5 капель, постепенно увеличив до 15 капель.
393. Sol. arsenic. Fowleri 2,0
Tinct. Chinae comp. 18,0
M. D. S. Начать с 10 капель на прием 3 раза в день.
394. Sol. arsenical. Fowleri
Tinct. amarae aa 10,0
M. D. S. По 3—4 капли 3 раза в день, постепенно дойти до 10 капель на прием.
395. Ac. arsenicosi 0,03
Chinini muriatici 5,0
Extr. Gentianae q. s. ut f. pilul. № 60.
D. S. По 1—2 пил. 3 раза в день после еды.
396. Ac. arsenicosi 0,1—0,2
Piperis nigr. 2,0
Pulv. et succi Liquirit. q. s. ut f. pilul. № 100.
D. S. По 1 пилюле 2—3 раза в день.

397. Ac. arsenicosi 0,1
 Ferri hydrog. reducti 3,0
 Pulv. et succi Liquirit. q. s. ut f. pilul. № 100
 D. S. По 1 пилюле 2—3 раза в день.
398. Ac. arsenicosi 0,05
 Ferri hydrog. red. 4,0
 Chinini muriatici 2,0
 Extr. Gentianae q. s. ut f. pilul. № 60.
 D. S. По 1 пилюле 2 раза в день; через неделю—
 3 раза в день.
399. Liq. Natril arsenicici (Liq. arsenicalis Pearson.) 20,0
 D. S. По 5 капель 3 раза в день после еды;
 дойти до 10 капель на прием (действует
 слабее, чем соединения As_2O_3).
400. Natrii arsenicici 0,5
 Sol. Ac. carbol. cryst. $\frac{1}{2}\%$ 50,0
 M. D. S. Steril.
 Подкожно по $\frac{1}{4}$ —1 см³.
401. Natrii kakodylici 1,25
 Sacchari. albi
 Gummi arabici
 Aq. glycer. \bar{a} q. s. ut f. pilul. № 50.
 D. S. По 1 пилюле 3 раза в день.
402. Natrii kakodylici 2,0
 Aq. destillatae 20,0
 M. D. S. По 10—15 капель 3 раза в день.
403. Ac. kakodylici 0,5
 Natrii bicarbonici 3,0
 Aq. destillatae ad 150,0
 M. D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
404. Natrii kakodylici 1,25—2,0
 Sol. ac. carbol. cryst. $\frac{1}{2}\%$ 20,0
 M. D. S. Steril.
 Подкожно по $\frac{1}{4}$ —1 см³.

405. Ferri hydrog. reducti 0,05—0,2
Sacchari albi 0,05—0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 30
S. По 1 порошку 3 раза в день после еды.
406. Ferri hydrog. reducti 2,0—3,0
Extr. et pulv. Liquirit. q. s. ut f. pilul. № 50
D. S. По 1—2 пил. 3 раза в день после еды.
407. Ferri carbonici saccharati 0,1—0,3
Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. t. d. № 30
S. По 1 порошку 3 раза в день.
408. Ferri sulfurici oxydul. puri sic. 2,5—5,0
Extr. et pulv. Liquirit. q. s. ut f. pilul. № 50
D. S. По 1 пил. 3 раза в день после еды.
409. Ferri sulfurici 5,0
Natrii bicarbonici 3,5
Sacchar. albi 0,8
Mellis depurati 2,6
Pulv. Althaeae q. s. ut f. pilul. № 100
D. S. По 2—3 пил. 3 раза в день после еды.
(Pilul. Valetti).
410. Ferri sulfurici oxydulati
Kalli carbonici за 10,0
Pulv. Tragacanth.
Aq. destillatae q. s. ut f. pilul. № 100
D. S. По 1—2 пил. 3 раза в день после еды.
(Pilul. Blaudii).
411. Pilular. Blaudii cum acid. arsenicos. à 0,001
D. t. d. № 50
S. По одной, через некоторое время по 2 пи-
люли в день за едой.

412. Pilul. Blaudii cum Aloes à 0,005
D. t. d. № 50
S. По 1—2 пилюли 3 раза в день после еды
(при эзопорах).
413. Ferri sulfu*ri* sic. ?
Aloes pulver. аз 2,0—5,0
Extr. et. pulv. Liquirit. q. s. ut f. pilul. № 100
D. S. По 1—2 пилюли 3 раза в день.
414. Extr. Strychni 0,6
(s. Strychnini. nitrici 0,02)
Ferri reducti
Chininii sulfu*ri* аз 2,0
Extr. Gentianhae q. s. ut f. pilul. № 60
D. S. По 1—2 пил. 2—3 раза в день.
415. Ferri lactici 0,3
Sacchari albi 0,2
M. f. pulv. D. t. d. № 50
S. По 1 порошку 3 раза в день.
416. Ferri lactici 5,0—10,0
Extr. et pulv. Liquirit.
q. s. ut f. pilul. № 50
D. S. По 1 пилюле 3 раза в день.
417. Sirupi Ferri iodati 50,0
D. S. По 10—15 кап. до 1 чайной ложки на прием, 2—3 раза в день.
418. Sirupi Ferri iodati 2,0
simplic. 60,0
M. D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в день
(детям).
419. Ferri oxydatis saccharatis solubil. 4,0
Extracti Rhei 2,0
Pulv. et succi Liquirit. q. s. ut f. pilul. № 40
D. S. По 1 пил. 3 раза в день.

420. Tinct. Ferri pomati 25,0
D. S. По 15—20 кап. на прием 3 раза в день.
421. Tinct. Ferri pomati
amarae ~~aa~~ 20,0
M." D. S. По ½—1 чайн. ложке 2—3 раза в день.
422. Liq. Ferri albuminati 100,0
D. S. По ½—1 чайн. ложке 3—4 раза в день
после еды.
423. Calcii glycerophosphorici 0,25—0,5
D. t. d. № 20
S. По 1 порошку 3 раза в день.
424. Phitini 0,5
D. t. d. № 25
S. По 1 пор. 2—3 раза в день.
425. Phosphreni in tabul. № 30
D. S. 2—4 табл. в день (комбинация органич.
фосфора, гематогена, лецитина, Fe и Ca).
426. Vitaminoli 10,0
D. S. По 3—5 и больше капель на прием 2—3
раза в день.
427. Olei jecoris aselli 100,0
D. S. По 1 чайной—столовой ложке 1—2 раза
в день за едой.
428. Phosphori 0,01
Ol. Jecoris aselli 100,0
M. D. S. По 1—2 чайных ложки в день.
429. Phosphori 0,01
Ol. Amygdalar.
(s. emuls. ol. amygd.) 100,0
M. D. S. По 1—2 чайных ложки в день.
430. Phosphori 0,01
Ol. Amygdal. 10,0
M. D. S. По 5—10 капель 2—3 раза в день.

431. Kalii s. Natrii jodati 1,5—8,0
Aq. destillatae 180,0
Ol. Menthae pip. gtt. V
M. D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день
после еды.
432. Kalii jodati 10,0
Aq. destillatae 50,0
M. D. S. Начать с 20 кап. на прием, увеличив
до 40—50 капель; 3 раза в день после еды.
433. Sol. Kalii jodati 5% 25,0
D. S. Начать с 2—3 кап., постепенно увеличив
до 20 кап. на прием 3 раза в день (простая
гипертрофия щитовидной железы).
434. Sol. Natrii jodati 5—10% 10,0
D. S. Steril. Подкожно по 2 см³ (мышечный
ревматизм), по 2—5 см³ для глубоких инъекций
в область п. ischiadic.
435. Sol. Natrii jodati 10% 10,0
Novocaini 0,05
M. D. S. Steril. Для глубоких инъекций по
3 см³ по боковым линиям около поясничных
позвонков (Lumbago).
436. Tinct. Jodi 15,0
D. S. По 2—3 капли 3 раза в день.
437. Jodipini 10% 50,0
D. S. По ½—1 чайной ложке (до столовой)
на прием.
438. Atophani 0,5—1,0
D. t. d. № 15
S. По 1 порошку 3 раза в день.
439. Piperazini 0,5—1,0
D. t. d. № 20
S. По 1 пор. 2 раза в день в содовой воде.

440. Tinct. Colchici 20,0
D. S. По 15—25 капель 3 раза в день (во время приступа подагры).
441. Colchicini 0,01
Extr. et pulv. Liquorit. q. s. ut f. pilul. № 10.
D. S. По 4 пилюли в первый день, 3—в 2-й,
2—в 3-й и 1—в 4-й.
442. Ac. ascorbinici 0,25
Aq. destillat. 10,0
D. S. Sterilis. По 2 см³ внутривенно 1—2 раза в день.
443. Ac. ascorbinici (Vitamin C) 0,05
D. t. d. № 20 in tabulettis.
S. По 1 таблетке 2 раза в день.

XI. НЕКОТОРЫЕ ПРОПИСИ ИЗ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ.

444. Novocaini 0,2—0,4
Sol. Natrii chlorati 0,85% 20,0
Sol. Adrenalinii hydrochlor. 1:1000 gtt. X—XX
M. D. S. Sterilis.
Для проводниковой, сакральной, паравертербальной анестезии.
445. Novocaini 0,25
Sol. Natrii chlorati 0,85% 50,0
Sol. Adrenal. hydrochlor. 1:1000 gtt. V—X
M. D. S. Sterilis.
Для инфильтрационной анестезии.
446. Novocaini 0,25
Sol. Natrii chlorati 0,85% 5,0
Sol. Adrenal. hydrochlor. 1:1000 gtt. V.
M. D. S. Sterilis.
Для спинномозговой анестезии (2 см³).

447. Novocaini 2,5
Natrii chlorati 6,0
Kalii chlorati 0,075
Calcii chlorati 0,125
Aq. destillat. ad 1000,0
M. D. S. Sterilis.
Для местной анестезии по методу пол.учего
инфиль рата Вишневского.
448. Novocaini 0,12
Sovcaini (Percaini) 0,01
Sol. Natrii chlorati 0,85% 100,0
Sol. Adrenal. hydrochlor. 1:1000 gtt. X—XX.
M. D. S. Sterilis.
449. Cocaini hydrochlorici 0,05
Sol. Natrii chlorati 0,85% 50,0
Sol. Adrenal. hydrochlor. 1:1000 gtt. V—X
M. D. S. Sterilis.
Для инфильтрационной анестезии.
450. Cocaini hydrochlorici 0,05
Sol. Natrii chlorati 0,85% 5,0
Sol. Adrenal. hydrochlor. 1:1000 gtt. X
M. D. S. Для проводниковой анестезии.
451. Sol. Dicaini 0,05—0,1—1,0% 25,0—50,0
D. S. Sterilis. Для инфильтрационной (0,05—
0,1%), лумбальной (0,5%), поверхностной
(1%) анестезии.
452. Sol. Sovcaini (Percaini)—0,05—0,15% 50,0
D. S. Sterilis. Для инфильтрац., проводнико-
вой и лумбальной анестезии.
453. Anaesthesini 2,0
Dermatoli 20,0
Vaselini fl. ad 200,0
M. f. unguent.
D. S. При ожогах.

454. Ac. tannici 3,0
Aq. destilat. 100,0
M. D. S. Смачивать кожу при ожогах 2-й степени.
455. Naphthalani
Zinci oxydati
Talc. veneti $\bar{a}a$ 20,0
Vaselini fl. 100,0
M. f. unguent.
D. S. Мазь при ожогах.
456. Xeroformii 3,0
Pecis liquidae (s. Ol. Cadini) 3,0—5,0
Ol. ricini 100,0
M. f. unguent.
D. S. Оригинальная пропись мази проф. А. В. Вишневского.
457. Sol. Chloramini 0,5% 200,0
D. S.
458. Sol. Natrii hypochlorosi Dakin neutralis 100,0
D. S.
459. Sol. Chloracidi 1—2% 200,0
D. S.
460. Sol. Bactericidi 1:3000 200,0
D. S.
461. Sol. Acrididi (Rivanoli) 1:500—1:1000 100,0
D. S. Для обработки инфицированных ран, инъекций в полость абсцесса и пр.
462. Sol. Acrididi 1:250—1:500
Sol. Novocaini 1:200 $\bar{a}a$ 100,0
M. D. S. Для инъекций в гнойный очаг по 3—5—10 см³.

463. Acrididi (Rivanoli) 0,25
Spirit. vini 75,0
Aether. sulfuris 25,0
M. D. S. Обильно смазать поверхность, пораженную рожистым воспалением и покрыть вазелином.
464. Liq. Burowi (Liq. Aluminii acetici) 100,0
D. S. Для компрессов.
465. Liq. Burowi 100,0
D. S. По 1 стол. ложке на стакан воды -- для примочки.
466. Sol. Urotropini 40% 25,0
D. S. Sterilis. По 5—10 см³ внутривенно.
467. Acrididi (Rivanoli) 0,3--0,5
Aq. destillat. 100,0
M. D. S. Sterilis.
Внутривенно при общей стрептококковой инфекции.
468. Streptocidi albi 0,3
D. t. d. № 15 in tabulettis
S. По 1 табл. 5—6 раз в день.
469. Streptocidi rubri 0,3
D. t. d. № 15 in tabulettis
S. По 1 табл. 5—6 раз в день.
470. Sol. Atropini sulfurici 0,1% 10,0
D. S. Sterilis. По 1/2—1 см³ подкожно 1—2 раза в день.
471. Sol. Lobelini hydrochlorici 1% 1,0
D. t. d. № 6 in ampullis.
S. По 1/2—1 см³ подкожно.

472. Ac. tannici 1,0
Liq. Plumbi subacetici 2,0
Axungiae porcinae 20,0
M. f. unguent.
D. S. Для смазывания пролежней.
473. Bailli sulfurici pro Roentgeno 50,0—100,0
D. S.
474. Jod-benzimi 0,1% 100,0
D. S.
475. Jodi puri 0,1
Vaselini 1,0
Benzini 100,0
M. D. S. Иод—бензин.
476. Natrii chlorati 8,5
Kalii chlorati
Calcii chlorati
Natrii bicarbonici 2 0,2
Aq. destillat. ad 1000,0
M. D. S. Sterilis.
Раствор Рингера для внутривенного введения.
477. Colophonii 40,0
Aether. sulfur. 15,0
Spirit. vini 35,0
Ol. Helianthi 1,0
M. D. S. Клеольь.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Проф. Н. П. Шавров. Врачебное выписывание рецептов.
2. И. А. Обергард. Технология лекарственных форм. ГИЗ, 1929 г.
3. Б. А. Окс. Медицинский латинско-русский словарь. Изд. 7-е, ОГИЗ, 1934 г.
4. Справочные таблицы для аптек и аптечных учреждений. Под редакцией проф. В. И. Скворцова, Биомедгиз, 1935 г.
5. Проф. М. Я. Брейтман. Неразумные рецепты и несовместимые лекарственные вещества. Л., 1924 г.
6. Проф. К. В. Бенинг. Несовместимые лекарственные вещества и нерациональные рецептурные формы. Казань, 1925 г.
7. И. И. Левинштейн. Затруднительные рецепты. 1932 г.
8. Д-р С. И. Шерман. Разбор несовместимых и неразумных рецептов с приложением рецептурных формул и таблиц несовместимостей. Казань, 1927 г.
9. Д. М. Щербачев. Несовместимые лекарственные смеси.
10. Проф. В. И. Скворцов. Курс фармакологии для студентов и врачей.
11. Академик Н. П. Кравков. Основы фармакологии. 2 тома.
12. Проф. М. И. Граменицкий. Учебник фармакологии с элементами токсикологии. Л. 1935 г.

13. Р. Кешни. (R. Cушнай). Руководство по фармакологии. Л., 1930—31 гг., 2 тома.
 14. Проф. Н. В. Вершинин. Фармакология как основа терапии. М.-Л., 1938 г.
 15. R. Kobert. Учебник фармакотерапии, 2-е изд. СПБ., 1909—1910 гг., 2 полутома.
 16. Проф. В. И. Скворцов. Фармакотерапия. Статья в 1 томе „Основ терапии“ под редакцией Бруштейна и Плетнева, 1923 г.
 17. Я. А. Ловцкий и М. Я. Брейтман. Клиническая фармакотерапия. М.-Л., 1930 г.
 18. R. Trendelenburg. Основы общей и частной рецептуры. Фармакология практического врача. Харьков, 1928 г.
 19. Г. Пришибрам. Терапия внутренних болезней. Теория и практика. Л., 1928 г.
 20. П. Заксль. Достижения и проблемы терапии внутренних болезней. ГИЗ, 1928 г.
 21. Проф. З. Цондек. Лечение болезней сердца. ГИЗ, 1929 г. и ряд др. выпусков „Библиотеки практического врача“.
-

ОГЛАВЛЕНИЕ.

| | Стр. |
|--|------|
| <i>Рецепт: некоторые правила прописывания его</i> | 3 |
| Перечень наиболее употребительных в рецептурной практике терминов и их сокращений | 5 |
| Шаблонные формы рецептов | 8 |
| Вычисления при выписывании рецепта | 10 |
| <i>Важнейшие рецептурные формы и их особенности</i> | 13 |
| Твердые лекарственные формы | 13 |
| Мягкие лекарственные формы | 17 |
| Жидкие лекарственные формы | 19 |
| <i>Химически несовместимые и нерациональные комбинации лекарственных веществ</i> | 26 |
| Лекарственные препараты, содержащие алкалоиды | 35 |
| Кисло реагирующие лекарственные препараты . | 35 |
| Щелочно реагирующие лекарственные препараты | 36 |
| Лекарственные препараты, содержащие дубильные вещества | 37 |
| <i>Способы стерилизации некоторых препаратов</i> | 38 |
| <i>Высшие дозы однократных и суточных приемов ядовитых и сильно действующих средств для взрослых</i> | 41 |
| <i>Дозировка наиболее употребительных лекарств по возрастам</i> | 46 |

| | |
|---|-----|
| <i>Наиболее употребительные рецепты</i> | 56 |
| I. Средства, действующие на нервную систему | 56 |
| II. Сердечно-сосудистые средства | 60 |
| III. Кровоостанавливающие средства | 66 |
| IV. Средства, действующие на обмен воды . . | 71 |
| V. Средства, действующие на потоотделение . | 73 |
| VI. Средства, действующие на дыхательный | |
| аппарат | 75 |
| VII. Средства, действующие на органы пище- | |
| вания | 82 |
| VIII. Средства жаропонижающие | 99 |
| IX. Противомалярийные средства | 102 |
| X. Средства, действующие на обмен веществ | 106 |
| XI. Некоторые прописи из хирургической прак- | |
| тики | 112 |
| Литература | 117 |

Отв. за выпуск *И. Фомин.* Корректор *З. Чуднова.*

НГ22255. Подп. к печ. 29/VIII 1942 г. Уч.-изд. л. 6.
Печ. л. 3³/₄. Знаков в бум. л. 126. Тираж 10000.
Цена 1 р. 80 к. + Переплет 20 коп.

Саратов. Тип. № 1 Полиграфиздата. Заказ № 1652.

ОПЕЧАТКИ

| Стран. | Строка | Напечатано | Следует |
|--------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| 16 | 8 сверху | (Ext. r. Faecis siccum) | (Extr. Faecis siccum) |
| 27 | 14 снизу | (анил-нитрат) | (амил-нитрит) |
| 39 | 1 сверху | glucerinum | glycerinum |
| * | 2 сверху | glycosa | glucosa |
| 50 | 3 сверху | Ammonii anisati | Ammonii anisatus |
| 52 | 5 сверху | Phosphorum | Phosphorus |
| 54 | 3 сверху | nucis vomicis | Nucis vomicae |
| 58 | 17 сверху | Natrii bromati 6,0—80 | Natrii bromati 6,0—8,0 |
| 61 | 10 сверху | D. S. По 20—25 кап. | D. S. По 10—15 кап. |
| 114 | 12 сверху | Pecis | Picis |

Pauline W.

2 pyō.